

S P I S Y

VYDÁVANÉ

PŘÍRODOVĚDECKOU FAKULTOU  
MASARYKOVY UNIVERSITY

REDAKTOR

PUBLICATIONS

DE LA

FACULTÉ DES SCIENCES  
DE L'UNIVERSITÉ MASARYK

RÉDIGÉES PAR

BOHUSLAV HOSTINSKÝ

ROK 1929

Čís. 105


# ITER TURCICO-PERSICUM

PARS IV.

## PLANTARUM COLLECTARUM ENUMERATIO (PLUMBAGINEAE-CYPERACEAE)

SCRIPSIT

DR. FR. NÁBĚLEK  
*Farlow*



VYCHÁZÍ S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVĚTY

VLASTNÍM NÁKLADEM VYDÁVÁ

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

BRNO, KOUNICOVA 63

NA SKLADĚ MÁ

|

EN VENTE CHEZ

KNIHKUPECTVÍ A. PÍŠA, BRNO, ČESKÁ 28



S P I S Y  
VYDÁVANÉ  
PŘÍRODOVĚDECKOU FAKULTOU  
MASARYKOVY UNIVERSITY  
REDAKTOR

PUBLICATIONS  
DE LA  
FACULTÉ DES SCIENCES  
DE L'UNIVERSITÉ MASARYK  
RÉDIGÉES PAR

BOHUSLAV HOSTINSKÝ

ROK 1929

Čís. 105

# ITER TURCICO-PERSICUM

PARS IV.

## PLANTARUM COLLECTARUM ENUMERATIO (PLUMBAGINEAE-CYPERACEAE)

SCRIPSIT

DR. FR. NÁBĚLEK

VYCHÁZÍ S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVĚTY

VLASTNÍM NÁKLADEM VYDÁVÁ  
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA  
BRNO, KOUNICOVA 63

NA SKLADĚ MÁ

EN VENTE CHEZ

KNIHKUPECTVÍ A. PÍŠA, BRNO, ČESKÁ 28



ITER TURCICO-PERSICUM.  
PLANTARUM COLLECTARUM ENUMERATIO.

PARS IV.

Ad publicandum tradita XI. 1928.

[Pars I.: harum Publicationum Nr. 35, pars II. Nr. 52, pars III. Nr. 70.]

**Plumbagineae.**

**Acantholimon Assyriacum** Boiss. [= *A. venustum* Boiss. var. *Assyriacum* Boiss. *Flora Orientalis* IV. pag. 832; cf. Handel-Mazzetti: *Pteridoph. u. Anthoph. aus Mesopotam.* I. c. p. 391]. [Pag. 4, fig. 1.] *Kurdistaniae Turcicae* distr. Šerizor: in steppis inter pagos Baba Ğiğik et Kân-i-Watman dit. Erbil (Arbela) — Rewandûz, in lapidosis alt. ca. 900 m. 24. V. 1910 (No. 2719); distr. Berwari: ad fontem inter pagos 'Ain Nûne et Aradên dit. Amadia, in steppa lapidosa alt. ca. 1000 m. 15. VI. 1910 (No. 2720).

*A. Assyriacum* Boiss. var. nova **micraeme** Nk. et Bornm. [*A. venustum* Boiss. var. *micraeme* Nk. et Bornm.] (Tab. I., fig. 2\* et pag. 4, fig. 1.) *Differt a typo imprimis limbi calycini albi nervis atro-purpureis, limbi marginem superantibus et aristulas acutissimas ca. 1/2 mm longas formantibus. Ceterum laxe cespitosum, foliis glaucescentibus, ciliatulis, puberulis et calcareo-squamulatis, anguste linearibus, acutissimis, mucrone ca. 1—1.5 mm longo, pungenti, terminatis, 3—5 cm, plerumque 4 cm longis, infimis latioribus, 1—1.5 cm longis, omnibus pungentibus. Scapis ca. 5 cm longis, densiuscule puberulis, spicis laxis, 6--7-floris, distichis, rectis, rhachide vix flexuosa. Bractea exteriori interioribus fere aequilonga, puberula, ca. 1 cm longa, e basi ovata longe acuminata, acutissima, subcarinata, carina in mucronulum pungentem producta, anguste membranaceo-marginata; bracteis interioribus oblongis, praeter lineam dorsalem angustam, viridem, puberulam, omnino scariosis, hyalinis, mucronulatis. Calycis tubo 9—10 mm longo, inter nervos virides (in limbo purpureos) carmineo, limbo subbreuiore, niveo, siccitate saepe pallide fusciscente, plicato. Corolla magna, saturate carminea.*

Crescit cum specim. typicis in *Kurdistaniae Turcicae* distr. Berwari, in lapidosis ad fontem inter pagos Aradên et 'Ain Nûne dit. Amadia, alt. ca. 1000 m. Legi 15. VI. 1910 (No. 2720a).

*A. acerosum* Boiss. var. **brachystachyum** Boiss. [Pag. 4, fig. 2.] *Taurus Armenus*: mons Harefta inter pagos Baškala et Kočânes. in saxosis regionis alpinae alt. ca. 2800 m. 30. VIII. 1910 (No. 2717).

\* Tabularum appositarum parti V. quae sequetur.

*A. Schirazianum* Boiss. (? non florens). Persia australis: Kuh Chormûğ dit. Bušîr (Abu Šehr) in rupestribus calcar. ad cacumen montis alt. ca. 2000 *m.* 19. II. 1910 (No. 4529).




Fig. 1.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1—5 *Acantholimon Assyriacum* Boiss. 6—10 *A. Assyriacum* Boiss. var. *micracme* Nk. et Bornm. 1—10 ca.  $\frac{2}{4}$ .

*A. latifolium* Boiss. [Pag. 4 fig. 2.] Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkîari: vallis Châne inter pagos 'Ain Nûne et Hašîtha, in lapidosis humosis alt. ca. 1200 *m.* 21. VI. 1910 (No. 2721). Mons Choarra Sia supra pagum 'Ain Nûne, in lapidosis aridis alt. ca. 1300 *m.* 16. VI. 1910 (No. 2722).



Fig. 2.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1—5 *Acantholimon latifolium* Boiss., 6—9 *Acantholimon acerosum* Boiss. var. *brachystachyum* Boiss.

*A. roseum* Boiss. Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, ad rupes graniticas prope cacumen alt. ca. 2650 *m.* 23. VIII. 1910 (No. 2718).

## Plantagineae.

*Plantago major* L. Arabia Petraea: ad pagum Elğî prope Wâdi Mûsa (Petra), ad rivulum. 18. VI. 1910 (No. 1046). Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum 'Ain Nûne inter pagos Amadia et Hašîtha, ad fossas irrigationis alt. ca. 1000 *m.* 21. VI. 1910 (No. 1044). Armenia



Turcica: ad pagum Ćabachĉūr inter oppida Muš et Charput, in ruderatis alt. ca. 950 *m*, forma *longe petiolata, petiolis limbos ovato-oblongos aut oblongos, 7—8 cm longos et 3—4 cm latos, longitudine superantibus, 8—10 cm longis, scapis rectis, spicis laxiusculis*. 29. IX. 1910 (No. 1045).

*P. lanceolata* L. var. *genuina* Boiss. Arabia Petraea: ad pagum Elġi prope Petram (Wādi Mûsa), ad rivulum. 18. VI. 1909 (No. 1036).

*P. lanceolata* L. var. *eriphylla* Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: in steppis ad radices montium Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ėzîret-ibn-Ômar, alt. ca. 900 *m*. 27. VII. 1910 (No. 1037).

*P. saxatilis* M. B. Taurus Armenus: mons Harefta inter pagos Baškala et Koĉânes, in pascuis alpinis alt. ca. 2500 *m*. 30. VIII. 1910 (No. 1033).

*P. saxatilis* M. B. var. *nova adnivalis* m. *foliis anguste lanceolatis abbreviatis, florendi tempore longissimis ca. 4 cm longis, glaberrimis aut hic inde pilo solitario albo vestitis*. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: Halakur-Dar, ad septentr. ab oppido Ėzîret-ibn-Ômar, in alveolis nivalibus et ad nives tabescentes alt. ca. 2550 *m*. 25. VIII. 1910 (No. 1034).

*P. albicans* L. Judaea: ad pagum Tell Zacharia prope Dêr Abân dit. Hierosolymorum. 7. IV. 1909 (No. 1067). Arabia Petraea: ad pagum Elġi prope Petram (Wādi Mûsa). 18. VI. 1909 (No. 1066); Ėbel Hârûn (Hor) supra Petram, alt. ca. 1200 *m*. 19. VI. 1909 (No. 1069).

*P. cylindrica* Forsk. Arabia Petraea: Ėbel Hârûn (Hor) supra Petram (Wādi Mûsa), inter rupes arenaceas alt. ca. 1000 *m*. 19. VI. 1909 (No. 1028); ad oppidum Ma'ân, in deserto lapidoso. 20. VI. 1909 (No. 1024).

*P. amplexicaulis* Cavan. Persia austro-occidentalis (Susiana): Kûh Beijât (Ėbel Hamrîn) inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et oppidum Amara, ad terram nudam sabulosam. 27. III. 1910 (No. 1050).

*P. Loefflingii* L. Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Šellelat prope oppidum Šuštâr, ad limum in ripa fluv. Âb-i-Girgir. 9. III. 1910 (No. 1040); ad pagum Kaunak (Kônak) inter oppida Šuštâr et Dizfûl, sub frutic. Zizyphi nummulariae, forma aprica, nana, plantulae 1.5—2 *cm* altae capitulis etiam 1—2-floris. 12. III. 1910 (No. 1047 et 1048).

*P. Bellardi* All. *pedunculis foliis duplo brevioribus, demum recurvis, ad P. Creticam L. vergens*, specimina mea specim. Kotschyani ex Persia australi No. 62 simillima. Arabia Petraea: Ėbel Hârûn (Hor) supra Petram (Wādi Mûsa), inter rupes arenaceas alt. ca. 950 *m*. 19. VI. 1909 (Nr. 1061). Persia austro-occidentalis (Susina): ad pagum Kaunak (Kônak) inter oppida Šuštâr et Dizfûl, ad terram nudam. 12. III. 1910 (No. 1064); ad fluvium Ćekâb inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran), 24. III. 1910 (No. 1027). Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Salahġe (Kifri) inter Hanikîn et Kerkuk, ad rupes gypsaceas Šêch Zoar, alt. ca. 350 *m*. 10. V. 1910 (No. 1063).

*P. Cretica* L. Judaea: ad pagum Latrûn dit. Hierosolymorum, ad terram nudam alt. ca. 300 m. 2. IV. 1909 (No. 1065); in saxosis inter Hebron et Bethlehem, alt. ca. 750 m. 27. V. 1909 (No. 1062).

*P. ovata* Forsk. Persia australis: ad pagum 'Ali Čengi dit. Bušîr (Abu Šehr). ad terram nudam copiosissima. 15. II. 1910 (No. 1039). Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Banauda (Bend-i-Kîr) inter Ahwâs et Šuštâr, ad terram nudam limosam in ripa fluv. Âb-i-Gîrgîr. 8. III. 1910 (No. 4532); Mesopotamia: in deserto limoso ad Babylon. 18. IV. 1910 (No. 1038 et 1049, forma *foliis lanceolatis, scapiis foliis brevioribus, declinatis*). 18. IV. 1910 (No. 1049).

***Plantago thrichophylla* Nábělek sp. nova.** (Tab. IV, fig. 4 et pag. 6. fig. 3.) *Annua, forsan perennans, pumila, acaulis. Folia angustissime linearia, fere filiformia, canaliculata, in margine integra aut hic inde denticulo calloso praedita, basi vaginatim dilatata et vaginis quasi bulbillos anguste cylindricos formantia, plus minus albo-pilosa, usque 10 cm longa. Scapi graciles, foliis aequilongi, demum folia superantes, erecti aut e basi procumbente erecto-ascendentes, villosuli. Spicae ovato-globosae, primum nutantes, tum erectae. Bracteae glabrae, late ovato-orbiculatae, obtusae, praeter nervum centralem carinam formantem omnino scariosae, hyalinae, ca. 3 mm longae, calycem aequantes. Calycis lacinae oratae, obtusae, glabrae, in margine convolutae, carinatae, praeter carinam omnino scariosae, hyalinae. Corollae lobis ovatis, acuminatis, acuti, brevissime mucronulati, dorso et apice fuscii, in margine hyalini, ca. 2 mm longi. Semina in capsulis bina, elliptica, pallide fusca, dorso rotundata, ventre profunde sulcata, usque 3 mm longa et 1.5 mm lata.*



Fig. 3.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

*Plantago thrichophylla* Nk. 1. Flos cum bractea. 2. Corollae lobus. 3. Calyx. 4. Bractea. 5. Semen (ventr.). Fig. 1—5 ca.  $\frac{5}{1}$ .

*Plantaginem Loefflingii* L. et *P. ovatam* Forsk. habitu refert, in quarum affinitatem pertinere videtur, sed ab eis speciebus brevioribus, plus orbiculatis, bracteis et calycis laciniis angustius et prominentius carinatis, corollae lobis brevioribus et angustioribus, indumento tenuiore, scapis gracilioribus, et imprimis foliis angustissimis differt.

Habitat in Persia austro-occidentali (Susiana): ad ruinas Susorum, in graminosis, legi 16. III. 1910 (No. 1025), ad fluvium Čekâb inter Susa et Deilerûn (Deh-i-Loran), ad terram nudam limosam, legi 24. III. 1910



(No. 1031), in convalle Cherr-e-Nemek in collibus Kuh-Beijât (Ġebel Hamrîn) inter Deilerûn et oppidum Amara, ad terram nudam, sabulosam, 27. III. 1910 (No. 1030).

*P. Haussknechtii* Vatke. Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Banauda (Bend-i-Kîr) inter Ahwâs et Šuštar, ad limum in ripa fluv. Âb-i-Girgir. 8. III. 1910 (No. 1043); Kûh Beijât (Ġebel Hamrîn) inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et oppidum Amara, ad terram nudam sabulosam. 27. III. 1910 (No. 1041).

*P. notata* Lagasc. Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Banauda (Bend-i-Kîr) inter Ahwâs et Šuštar, ad limum in ripa fluv. Âb-i-Girgir, 8. III. 1910 (No. 1032).

*P. Boissieri* Hausskn. et Bornm. [Bornmüller: Mitteilungen d. Thür. botan. Ver., neue Folge Heft VI (1894) pag. 60]. Persia austro-occidentalis (Susiana): ad fluv. Dwerîč (Duweirič) inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran), ad terram nudam arenosam, 24. III. 1910 (No. 1068); ad fluv. Ćekâb eiusdem ditionis, 24. III. 1910 (No. 1070); in planitie subsalsa inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et fluv. Tîb. 27. III. 1910 (No. 1071).

*P. Lagopus* L. Judaea: ad pagum Latrûn dit. Hierosolymorum, in lapidosis alt. ca. 300 *m.* 2. IV. 1909 (No. 1073). Arabia Petraea: Wâdi el-Hsâ inter El-Kerak et Et-Tafile, in lapidosis aridissimis alt. ca. 450 *m.* 16. VI. 1909 (No. 1075). Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Banauda (Bend-i-Kîr) inter Ahwâs et Šuštar, ad limum in ripa fluv. Âb-i-Girgir. 8. III. 1910 (No. 1035). Ad ruinas Susorum: ad terram nudam apricam formae diminutae. 16. III. 1910 (No. 1072); inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran), in alveolis subhumidis inter gramina f. maior (non subcaulescens) scapis usque 40 *cm* altis. 24. III. 1910 (No. 1074).

*P. Coronopus* L. Syria: ad fluv. Nahr Litâni infra castellum Kal'a Šukif (Belfort). 27. IV. 1909 (No. 1052). Persia austro-occidentalis (Susiana): Kûh Beijât (Ġebel Hamrîn) inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et oppidum Amara, ad terram nudam subsalsam. 27. III. 1910 (No. 1060). Mesopotamia: in deserto limoso ad Babylon. 18. IV. 1910 (No. 1057). Assyria: Ġebel Hamrîn inter Bardâd et Hanikîn, ad terram nudam alt. ca. 180 *m.* 2. V. 1910 (No. 1053). Kurdistania Persica: Ķasr-i-Širîn dit. Hanikîn, ad terram nudam alt. ca. 400 *m.* 3. V. 1910 (No. 1051).

*P. Coronopus* L. var. *integra* Gr. et Gdr. (= var. *simplex* Boiss.). Persia australis: ad pagum 'Ali Ćengi dit. Bušîr (Abu Šehr), ad terram nudam subsalsam aridissimam f. nana, aprica. 15. II. 1910 (No. 1042); ad pagum Hawîze dit. Bušîr, ad terram nudam. 18. II. 1910 (No. 1056). Persia austro-occidentalis (Susiana), frequens ad terram nudam subsalsam inter ruinas Susorum, Deilerûn (Deh-i-Loran) et fluv. Tîb, formae scapis brevibus, crassibus, prostratis et ascendentibus (No. 1054,

1055, 1059) et scapis elongatis folia superantibus, gracilioribus, erectis (No. 1058).

*P. Psyllium* L. Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, alt. ca. 700 *m*, 24. III. 1909 (No. 1077); Jericho, alt. ca. -250 *m*. 19. III. 1909 (No. 1078). Arabia Petraea: Ğebel Hârûn (Hor) supra Petram, alt. ca. 900 *m*. 19. VI. 1909 (No. 1029).

*P. Psyllium* L. var. *stricta* (Schousb.) Bornm. [Bornmüller: Beitr. zur Flora v. Syr. Pal., Verh. d. Zool.-botan. Ges., Wien, Bd. 48 (1898) pag. 626.] Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Banauda (Bend-i-Kîr) inter Ahwâs et Šuštar, ad limum in ripa fluv. Âb-i-Girgir copiosissima. 8. III. 1910 (No. 1076).

## Chenopodiaceae.

(Salsolaceae).

*Beta vulgaris* L. Mesopotamia: Babylon, inter segetes. 18. IV. 1910 (No. 1103).

*Chenopodium Vulvaria* L. Mesopotamia: Môşul, in ripa Tigridis. 30. V. 1910 (No. 1097).

*Ch. ficifolium* Sm. Mesopotamia: Kerbela, ad fossam irrigationis Nahr Hosseinîje. 16. IV. 1910 (No. 1102).

*Ch. album* L. Armenia Turcica: Wan, in rudertis alt. ca. 1800 *m*. 10. IX. 1910 (No. 1101).

*Ch. murale* L. Judaea: 'Ain Ğidi (Engaddi) ad litus occidentale Maris Mortui, alt. ca. -250 *m*. 27. V. 1909 (No. 1090); inter 'Ain Ğidi et Hebron, alt. ca. 500 *m*. 27. V. 1900 (No. 1089). Persia austro-occidentalis (Susiana): prope tentoria Deilerûn (Deh-i-Loran), ad radices montium Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh). 25. III. 1910 (No. 1093). Mesopotamia: Kerbela, ad fossam irrigationis Nahr Hosseinîje. 16. IV. 1910 (No. 1091). Môşul, in ripa Tigridis. 30. V. 1910 (No. 1092). Kurdistania Turcica: S'ert, in rudertis, alt. ca. 900 *m*. 13. VII. 1910 (No. 1098).

*Ch. urbicum* L. Armenia Turcica: ad pagum Čabachčûr inter oppida Muş et Charput, in rudertis alt. ca. 950 *m*. 29. IX. 1910 (No. 1100).

*Ch. Botrys* L. Syria: Libanon, ad pagum Brumâna supra Beirût. in vineis alt. ca. 700 *m*. 12. X. 1909 (No. 1094). Kurdistania Turcicae distr. Hakkiari: ad pagum Haşîtha dit. Ğulamerik, in glarea rivi alt. ca. 1800 *m*. 17. VI. 1910 (No. 1096). Armenia Turcica: in glarea rivi Čame Golan inter oppida Muş et Charput, alt. ca. 1200 *m*. I. X. 1910 (No. 1095).

*Blitum virgatum* L. Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, ad viam et in agris alt. ca. 1900 *m*. 1. VIII. 1910 (No. 1104).

**Atriplex dimorphostegium** Kar. et Kir. Arabia Petraea: Ġebel Hârûn (Hor) supra Petram (Wâdi Mûsa), alt. ca. 1200 *m.* 19. VI. 1909 (No. 1105); ad oppidum Ma'ân, in deserto lapidoso. 20. VI. 1909 (No. 1106). Mesopotamia: Babylon, in deserto limoso subsalso ad fossam En-Nil. 18. IV. 1910 (No. 1107).

**A. Tataricum** L. Persia austro-occidentalis (Susiana), planities subsalsa ad Deilerûn (Deh-i-Loran), 27. III. 1910 (No. 1110) a nondum florens). Armenia Turcica: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, ad viam alt. ca. 1800 *m.* 1. VIII. 1910 (No. 1115).

**A. Tataricum** L. var. *virgatum* Boiss. Judaea: 'Ain Ġidi (Engaddi) ad litus occidentale Maris Mortui. Ad rivulum alt. ca. -250 *m.* 26. V. 1909 (No. 1110). Kurdistania Turcica: ad oppidum S'ert, in rudementis alt. ca. 1000 *m.* 13. VII. 1910 (No. 1116).

**A. portulacoides** L. Syria litoralis: Râs Beirût prope Beirût, ad viam in litore. 3. XI. 1910 (No. 1109).

**A. Palestinum** Boiss. Judaea: ad Jericho, in deserto alt. ca. -300 *m.* 19. III. 1909 (No. 1112). Arabia Petraea: in deserto lapidoso inter Elġi (Wâdi Mûsa) et Ma'ân. 20. VI. 1909 (No. 1111).

**A. Halimus** L. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, ad rivulum alt. ca. -200 *m.* 30. III. 1909 (No. 1099); 'Ain Ġidi (Engaddi) ad litus occident. Maris Mortui, alt. ca. -350 *m.* 26. V. 1909 (No. 60). Moab: Hammâm ez-Zerġa (Kalirrhôë) ad litus orientale Maris Mortui, alt. ca. -200 *m.* 28. VI. 1909 (No. 1113).

**Eurotia ceratoides** (L.) C. A. Mey. var. *ferruginea* Boiss. Armenia Turcica: in valle fluv. Chôšab (Šamiram-Su) prope oppidum Chôšab dit. Wan, alt. ca. 1800 *m.* 8. IX. 1910 (No. 1156); ad pagum Norkjuk dit. Chôšab, alt. ca. 1850 *m.* 28. VIII. 1910 (No. 1156 a).

**Ceratocarpus arenarius** L. Armenia Turcica: Topra Kaleb prope Wan, in agris sterilibus lapidosis alt. ca. 1850 *m.* 17. VIII. 1910 (No. 1118); in valle fluv. Chôšab (Šamiram-Su) prope oppidum Chôšab dit. Wan, ad viam alt. ca. 1900 *m.* 7. IX. 1910 (No. 1117).

**Kochia prostrata** (L.) Schrad. var. *canescens* Moq. Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, ad vias alt. ca. 1900 *m.* 1. VIII. 1910 (Nr. 1124); in valle rivi Howaraš inter pagos Baškala et Kočânes dit. Wan, in lapidosis alt. ca. 2000 *m.* Forma ramis rubellis. 30. VIII. 1910 (No. 1123).

**K. cana** Bge. Armenia Turcica: Wan, ad rupes calcareas et in incultis castelli, alt. ca. 1800 *m.* 19. VIII. 1910 (No. 1122).

**K. hirsuta** L. Persia austro-occidentalis (Susiana): ruinae Susorum, et-Tell, in alveolis. 16. III. 1910 (No. 1120).

**Bassia eriophora** (Schrad.) Ktze. [cf. Handel-Mazzetti, Pteridoph. und Anthoph. aus Mesopotamien und Kurdistan, l. c. pag. 141] Judaea: 'Ain Ġidi (Engaddi) ad litus occident. Maris Mortui, alt. ca. -250 *m.* 26. V. 1909 (No. 1127). Arabia Petraea: ad oppidum Ma'ân, in deserto



lapidoso. 21. VI. 1909 (No. 1125). Mesopotamia: ad pagum Meskene dit. Bardád, ad terram nudam limosam, 19. XII. 1909 (No. 1119); Babylon, in deserto limoso in alveolis praesertim inter ruinas frequens. 18. IV. 1910 (No. 1126).

**Arthrocnemum** glaucum (Delile) Ung. Judaea: El-Rôr prope Jericho, alt. ca. -300 *m*. 10. VI. 1909 (No. 1129).

**Haloenemum** strobilaceum (Pall.) Moq. Persia austro-occidentalis (Susiana): in planitie salsa inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et fluv. Tib. 27. III. 1910 (No. 1128).

**Suaeda** fruticosa (L.) Forsk. Moab: Rôr el-Mezra'a in peninsula El-Lisân Maris Mortui, alt. ca. -380 *m*. 14. VI. 1909 (No. 1134).

*S. vermiculata* Forsk. Persia austro-occidentalis (Susiana): Kuh Beijât (Ġebel Hamrîn) inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et oppidum Amara ad Tigridem, in deserto subsalso. 27. III. 1910 (No. 1137).

*S. altissima* (L.) Pall. Armenia Turcica: Wan, in litore ad rupes calcar. frequens. alt. ca. 1700 *m*. 16. VIII. 1910 (No. 47). Persia austro-occidentalis (Susiana): in planitie subsalsa ad Deilerûn (Deh-i-Loran) frequentissima. Determinatio specim. nimis juvenilium incerta. Caules subsalsi juveniles comeduntur, planta „gôgela“ vocatur. 26. III. 1910 (Nr. 1132).

*S. maritima* (L.) Dumont. Judaea: 'Ain Ġidi (Engaddi) ad litus occident. Maris Mortui, alt. ca. -200 *m*. 26. V. 1909 (No. 1133).

*S. Maris Mortui* Post. Judaea: 'Ain Ġidi (Engaddi) ad litus occident. Maris Mortui, cum praecedente. 26. V. 1909 (No. 1135).

**Haloxylon** articulatum (Cav.) Bge. [cf. Handel-Mazzetti, Pteridophyta u. Anthoph. aus Mesopotam, u. Kurdistan, l. c. pag. 147]. Persia austro-occidentalis (Susiana): Deilerûn (Deh-i-Loran), ad radices montium Siah-Kuh (Pust-i-Kuh). 25. III. 1910 (No. 1144); Kuh Beijât (Ġebel Hamrîn) inter Deilerûn et oppidum Amara ad Tigridem, in deserto salso frutices subglobosos ca. 1 *m* altos formans. 27. III. 1910 (No. 1145).

**Salsola** inermis Forsk. Judaea: 'Ain Ġidi (Engaddi) ad litus occident. Maris Mortui, alt. ca. -250 *m*. 26. V. 1909 (No. 1140). Moab: Rôr el-Mezra'a in peninsula Maris Mortui El-Lisân, alt. ca. -380 *m*. 14. VI. 1909 (No. 1108). Arabia Petraea: in deserto lapidoso ad oppidum Ma'an. 21. VI. 1909 (No. 1152). Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Tuz Chormati inter Salahije (Kifri) et Kerkuk, in salsis ad Kal'a Melech alt. ca. 250 *m*. 12. V. 1910 (No. 1154).

*S. crassa* M. B. Arabia Petraea: in valleculis in deserto lapidoso ad oppidum Ma'an. 20. VI. 1909 (No. 1155).

*S. longifolia* Forsk. var. *oppositifolia* (Desf.) Murb. Persia austro-occidentalis (Susiana) in planitie salsa inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et fluv. Tib. 27. III. 1910 (No. 1149); Kuh Beijât (Ġebel Hamrîn) inter Deilerûn et oppidum Amara. 27. III. 1910 (No. 1150).

*S. Auricula* Moq. var. *acutifolia* Moq. Persia austro-occidentalis (Susiana): Cherr-e-Nemek in monticulis Kuh Beijât (Ĝebel Hamrîn) inter Deilerûn et oppidum Amara ad Tigridem. 27. III. 1910 (Nr. 83).

*S. lancifolia* Boiss. Judaea: 'Ain Ğidi (Engaddi) ad litus occident. Maris Mortui, alt. ca. -300 *m.* 26. V. 1909 (No. 1136).

*S. rigida* Pall. var. *tenuifolia* Boiss. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, alt. ca. -100 *m.* 14. IV. 1909 (No. 1138).

*S. rigida* Pall. var. *villosa* Moq. Judaea: 'Ain Ğidi (Engaddi) ad litus occident. Maris Mortui, alt. ca. -200 *m.* 26. V. 1909 (No. 1131); Arabia Petraea: in deserto lapidoso ad oppidum Ma'ân. 20. VI. 1909 (No. 1130).

*Noëa mucronata* (Forsk.) Aschers. et Schwfth. (= *Noëa spinosissima* [L. f.] Moq.) Arabia Petraea: in steppis ad meridiem ab oppido El-Kerak frequens. 18. VI. 1909 (No. 1192). Armenia Turcica: Topra Kaleh supra oppidum Wan, ad rupes calcar. alt. ca. 1900 *m.* 17. VIII. 1910 (No. 1143); Taurus Armenus: in valle torrentis Howaraš ad pagum Baškala dit. Wan, in aridis alt. ca. 1900 *m.* 1. IX. 1910 (No. 368); ad pagum Kermechdi inter oppida Malatia et Maraš, inter sepes frequens. alt. ca. 1100 *m.* 9. X. 1910 (No. 1141).

*Anabasis aphylla* L. Moab: Wâdi Mōġib (Arnon) inter oppida Mādaba et El-Kerak, in declivit. aridissimis alt. ca. 350 *m.* 12. VI. 1909 (No. 1146). Arabia Petraea: in valleculis in deserto lapidoso ad oppidum Ma'ân fruticulos globosos atrovirides formans. 20. VI. 1909 (No. 1146 a).

*A. articulata* Moq. Judaea: 'Ain Ğidi (Engaddi) ad litus occidentale Maris Mortui, alt. ca. -350 *m.* 26. V. 1909 (No. 1148).

*A. setifera* Moq. Moab: Hammâm ez-Zerqa (Kallirrhō) dit. Mādaba, alt. ca. -200 *m.* 28. VI. 1909 (No. 1147).

*Petrosimonia Volvox* (Pall.) Bge. Persia austro-occidentalis (Susiana): planities subsalsa ad Deilerûn (Deh-i-Loran). 27. III. 1910 (No. 1139).

*Halocharis sulphurea* Moq. Susiana: planities subsalsa ad Deilerûn (Deh-i-Loran). 27. III. 1910 nondum florens (No. 1125). Kurdistania Turcica (Assyria): Kal'a Melech ad pagum Tuz Chormati inter Salahîje (Kifri) et Kerkuk, ad terram nudam salsam. 15. V. 1910 (No. 1153).

*Cornulaca Aucheri* Moq. Kurdistania Turcica (Assyria): rupes gypsumaceae Šêch Zoar ad pagum Salahîje (Kifri) inter Hanikîn et Kerkuk, alt. ca. 350 *m.* 10. V. 1910 (No. 1088). Armenia Turcica: Topra Kaleh supra Wan, in agris incultis alt. ca. 1900 *m.* 17. VIII. 1910 (No. 1087).

### Amarantaceae.

*Amarantus retroflexus* L. Arabia Petraea: ad pagum Elġi (Petra, Wâdi Mûsa). ad fontem. 18. VI. 1909 (No. 1081); Kurdistania Turcica: ad pagum Mâr Jakub dit. S'ert, in ruderatis, alt. ca. 900 *m.*



12. VII. 1910 (No. 1080); Armenia Turcica: in oppido Wan, in hortis et in ruderatis alt. ca. 1750 *m.* 10. IX. 1910 (No. 1082).

*A. Graecizans* L. (s. str.) Mesopotamia: Babylon, ad fossas irrigationis. 18. IV. 1910 (No. 1083a); Mōsul, in ripa Tigridis alt. ca. 250 *m.* 30. V. 1910 (No. 1083).

*Aerva Javanica* Juss. Palaestina: El-Rôr dit. Jericho, ad pontem Jordanis alt. ca. -350 *m.* 30. VI. 1909 (No. 1085); Judaea: 'Ain Ġidi (Engaddi) ad litus occidentale Maris Mortui, alt. ca. -300 *m.* 26. V. 1909 (No. 1084).

*Achyranthes aspera* L. var. *argentea* Boiss. Palaestina: 'Ain Duk dit. Jericho, alt. ca. -200 *m.* 31. III. 1909 (No. 1086).

### Polygoneae.

*Pteropryum Aucheri* J. et Sp. Kurdistania Turcica (Assyria): ad rivum Nahr Astêre inter Erbil (Arbela) et Kerkuk, alt. ca. 2.000 *m.* 20. V. 1910 (No. 462).

*P. ericoides* Boiss. (? nondum florens, sine acheniis): Persia austro-occidentalis: Cherr-e-Nemek in monticulis Kuh Beijât (Ġebel Hamrîn) inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et oppidum Amara. 27. III. 1910 (No. 1151).

*P. Olivieri* Jaub. et Sp. var. *gracile* Boiss. Taurus Armenus: supra pagum Šattak dit. Wan, in lapidosis alt. ca. 1700 *m.* 31. VII. 1910 (No. 463).

*Rheum Ribes* Gronov. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: mons Dwîle supra pagum Hašîtha dit. Ġulamerik, in saxosis granit. alt. ca. 2100 *m.* 18. VI. 1910 (No. 988 et 989. Caules et petioli comeduntur).

*Oxyria digyna* (L.) Campd. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter Hašîtha et Šattak, ad rupes calc. alt. ca. 2700 *m.* 28. VII. 1910 (No. 986); Taurus Armenus: mons Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, in pascuis alpinis alt. ca. 2750 *m.* 31. VIII. 1910 (No. 985); Ġelo-Dar dit. Ġulamerik, ad tentoria aestivalia Djezra, ad rupes granit. alt. ca. 2800 *m.* 3. IX. 1910 (No. 987).

*Emex spinosus* (L.) Campd. Palaestina orientalis: Ammân (Rabbath Ammon), in ruderatis alt. ca. 800 *m.* 16. IV. 1909 (No. 991); Galilaea: Tiberias, ad rupes alt. ca. -150 *m.* 21. IV. 1909 (No. 990).

*Rumex Alpinus* L. (? nimis juvenilis): Kurdistania Persica montes supra pagum Režâb dit. Ķasr-i-Šîrîn, ad rivum alt. ca. 1700 *m.* 5. V. 1910 (No. 995).

*R. angustifolius* Campd. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: mons Sîares prope pagum Hašîtha, in graminosis alt. ca. 1800 *m.* 19. VI. 1910 (No. 997).

*R. Patientia* L. Kurdistania Turcica: ad pagum Mâr Gorîa dit. S'ert, inter rupes calcar. alt. ca. 1200 *m.* 16. VII. 1910 (No. 998).

*R. crispus* L. Mesopotamia: Mōsul, in ripa Tigridis alt. ca. 250 *m.*

30. V. 1910 (No. 999); Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: traiectus inter pagos Hoz et Chômar inter Hašitha et Šattak, in pascuis alpinis alt. ca. 2300 *m* (determinatio propter fructus nimis iuvenes subdubia). 30. VII. 1910 (No. 996).

*R. dentatus* L. var. *pleiodon* Boiss. Palaestina: El-Rôr dit. Jericho, alt. ca. -350 *m*. 15. IV. 1909 (No. 1004); Mesopotamia: Môsul, in ripa Tigridis alt. ca. 250 *m*. 30. V. 1910 (No. 1003 et 1005).

*R. bucephalophorus* L. Phoenicia: ad pagum Ekzîb dit. Akka, ad litus. 30. IV. 1909 (No. 992).

*R. scutatus* L. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: mons Dwile supra pagum Hašitha, inter rupes granit. alt. ca. 2000 *m*. 18. VI. 1910 (No. 993). Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt dit. Wan, inter rupes granit. alt. ca. 2000 *m*. 1. VIII. 1910 (No. 994).

*R. thyrsoflorus* Fingerh. Kurdistania Persica: montes supra pagum Rezâb dit. Kasr-i-Šîrîn, ad rivum alt. ca. 1600 *m*. 5. V. 1910 (No. 1007). Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: mons Choarra Sia supra pagum 'Ain Nûne inter Amadia et Hašitha, in graminosis inter frutices quercuum alt. ca. 1400 *m*. 16. VI. 1910 (No. 1009). Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in graminosis alt. ca. 2000 *m*. 1. VIII. 1910 (No. 1006 et 1008); Warak-Dar prope Wan, ad monasterium Werin-Warak, ad rivulum alt. ca. 2200 *m*. 23. VIII. 1910 (No. 1010).

*R. vesicarius* L. var. *typicus* Murb. Mesopotamia: Babylon, leg. Dr. Reuter (No. 1002).

*R. roseus* L. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, in aridissimis alt. ca. -150 *m*. 17. III. 1909 (No. 1000); 'Ain Duk prope Jericho, alt. ca. -200 *m*. 31. III. 1909 (No. 1000a). Persia austro-occidentalis (Susiana): in fauce montium Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) prope Deilerûn (Deh-i-Loran), in glarea rivi. 25. III. 1910 (No. 1001).

*Atraphaxis spinosa* L. var. *Sinaica* Boiss. Arabia Petraea: in deserto lapidoso ad Ma'an. 20. VI. 1910 (No. 961).

*Polygonum Bistorta* L. var. *angustifolium* Meisn. Taurus Armenus: mons Harefta inter Baškala et Kočânes, in pascuis alpinis alt. ca. 2700 *m*. 31. VIII. 1910 (No. 971).

*P. amphibium* L.  $\alpha$  *natans*. Taurus Armenus: ad pagum Baraspi in monte Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, alt. ca. 2400 *m*. 31. VIII. 1910 (No. 973).

*P. serrulatum* Lag. Galilaea: 'Ain Tabra (Et-Tabîra) prope Tiberiadem, ad fontes alt. ca. -200 *m*. 21. IV. 1909 (No. 972).

*P. Persicaria* L. Persia austro-occidentalis (Susiana): in ripa fluv. Šaûr ad ruinas Susorum. 17. III. 1910 (No. 984). Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: ad pagum Tell Mišâr ad orientem ab oppido S'ert, ad rivum alt. ca. 760 *m*. 18. VII. 1910 (No. 977).

*P. lapathifolium* L. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: ad pagum Tell Mišâr ad orientem ab oppido S'ert, in fossis alt. ca.

760 *m.* 18. VII. 1910 (No. 977 a); Armenia Turcica: ad pagum Čabachčür inter Muš et Charput, ad fossas alt. ca. 950 *m.* 29. IX. 1910 (No. 978).

*P. corrigioloides* Jaub. et Sp. Mesopotamia: in deserto limoso ad Bardâd copiosissimum. 12. IV. 1910 (Nr. 976); ad Babylon, leg. Dr. Reuter (No. 974).

*P. argyrocoleum* Stend. Persia austro-occidentalis (Susiana): ad ruinas Susorum, in alveolis. 15. III. 1910 (No. 983); Mesopotamia: ad oppidum Kərbela, ad fossas irrigationis. 16. IV. 1910 (No. 979); ad Môsul, in ripis Tigridis copiosum. 30. V. 1910 (No. 982).

*P. Venantianum* Clem. (= *P. arenarium* W. K.) Mesopotamia superior (Ğebel et-Tur, Tur Abdîn): in agris sterilibus ad oppidum Midiat alt. ca. 900—1000 *m* copiosissimum. 10. VII. 1910 (No. 966).

*P. aviculare* L. Arabia Petraea: Wâdi el-Hsâ dit. El-Kerak, ad rivulum alt. ca. 450 *m.* 16. VI. 1909 (No. 980).

*P. equisetiforme* Sibth. et Sm. Judaea: ad pagum Tell Zacharia dit. Hierosolymorum, ad vias et margines agrorum alt. ca. 350 *m.* 7. IV. 1909 (No. 964); Moab: Wâdi Môğib (Arnon), ad rivum alt. ca. 400 *m.* 25. VI. 1909 (No. 965).

*P. alpestre* C. A. Mey. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: traiectus ad pagum Aradên dit. Amadia, ad fontem in latere septentrionali alt. ca. 1450 *m.* 15. VI. 1910 (No. 969); Kurdistaniae distr. Hakkiari: mons Siars supra pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, in humosis alt. ca. 1600 *m.* 19. VI. 1910 (No. 970); ad pagum Mâr Jakub dit. S'ert, in marginibus agrorum alt. ca. 900 *m.* 12. VII. 1910 (No. 968).

*P. luzuloides* Jaub. et Sp. Taurus Armenus: Warak-Dař prope Wan, in rupestribus granit. alt. ca. 2600 *m.* 23. VIII. 1910 (No. 967).

### Nyctaginaceae.

*Boerhaavia plumbaginea* Cav. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, alt. ca. -250 *m.* 19. III. 1909 (No. 1079).

### Thymelaeaceae.

*Daphne angustifolia* C. Koch. = *D. acuminata* Boiss. et Hoh. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: ad pagum Bengof dit. S'ert, alt. ca. 800 *m.* 20. VII. 1910 (No. 97); Taurus Armenus: supra pagum Šattak ad meridiem ab oppido Wan, in lapidosis alt. ca. 1700 *m.* 30. VII. 1910 (No. 96). Kurdistaniae distr. Hakkiari: in valle fluv. Zab infra pagum Kočânes, in lapidosis alt. ca. 1400 *m.* 2. IX. 1910 (No. 98) [kurdice „kan ôša“ vocatur; in Persia australi Kuh Chormûğ dit. Bušîr ex foliis et ramis pigmentum luteum extrahitur].

*D. linearifolia* Hart. Arabia Petraea: Wâdi Bseira inter El-Kerak et Wâdi Mûsa (Petra), inter rupes arenaceas alt. ca. 750 *m.* 17. VI. 1909 (No. 99).



*Thymelaea hirsuta* L. Phoenicia: ad pagum Ekzîb dit. Akka, inters ej es. 30. IV. 1909 (No. 95).

### Elaeagnaceae.

*Hippophaë rhamnoides* L. Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, od monasterium Werin-Warak, ad rivulum alt. ca. 1900 *m.* 23. VIII. 1910 (No. 214).

*Elaeagnus angustifolia* L. (= *E. hortensis* M. B.) Phoenicia: inter Tyrus et Akka, in sepibus fruticosa. 30. IV. 1909 (No. 218); Mesopotamia: Babylon, leg. Dr. Reuter (No. 215); Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: in valle fluv. Zab dit. Koçânes alt. ca. 1600 *m* silvulas formans; Armenia Turcica: in hortis in oppido Wan, forma culta fructibus edulibus, 17. IX. 1910 (No. 216); ad pagum Şenas inter Muş et Charput alt. ca. 1200 *m.* 1. X. 1910 (No. 217).

### Laurineae.

*Laurus nobilis* L. Palaestina borealis: mons Hermon (Ğebel eş-Şêch) supra pagum Bânias (Caesaraea Philippi), alt. ca. 700 *m.* 26. VI. 1909 (No. 332).

### Santalaceae.

*Osyris alba* L. Judaea: Bêt Ğemâl dit. Hierosolymorum, alt. ca. 450 *m.* 7. IV. 1909 (No. 212); Libanon: ad pagum Brumâna supra Beirût, in saxosis alt. ca. 650 *m.* 18. X. 1909 (No. 213).

*Thesium humile* Vahl. Judaea: El-Kubebe (Emaus) dit. Hierosolymorum, in agris alt. ca. 700 *m.* 26. VII. 1909 (No. 1186).

*T. impressum* Stend. var. *Kotschyanum* Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: mons Choarra Sia supra pagum 'Ain Nâne inter Aradên et Haşîtha, in graminosis inter rupes alt. ca. 1500 *m.* 16. VI. 1910 (No. 1188).

*T. macranthum* Fenzl. Kurdistania Turcica: ad pagum Mâr Jakub dit. Môşul, inter frutices quercuum alt. ca. 600 *m.* 10. VI. 1910 (No. 1187).

### Loranthaceae.

*Viscum cruciatum* Sieb. Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, ad Oleam europ. alt. ca. 600 *m.* 24. III. 1909 (No. 4502); Moab: Wâdi el-Bîre inter Mâdaba et El-Kerak, ad Crataegum Azarolum alt. ca. 550 *m.* 12. VI. 1909 (Nr. 4503); Arabia Petraea: El-Hôr inter Eş-Şôbak et Wâdi Mûsa (Petra), ad Crataegum Azarolum alt. ca. 750 *m.* 18. VI. 1909 (No. 4504).

*V. album* L. Syria borealis: Mar'as (No. 4500).

*Arceuthobium Oxycedri* (DC.) M. B. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: ad pagum Auwal in valle Bekât ad orientem ab oppido S'ert ad Juniperum Oxycedrum, 20. VII. 1910 (No. 4498); Kurdistaniae distr. Berwari: in valle Nazarki dit. Amadia ad Juniperum

*Oxycedrum* alt. ca. 900 *m* rarum, in valle Sapna eiusdem ditionis alt. 900—1000 *m* frequentissimum. 23. VI. 1910 (No. 4494, 4495 et 4499); Armenia Turcica: ad pagum Nağarli dit. Mar'aş alt. 900—1200 *m* frequentissimum. 13. X. 1910 (No. 4496 et 4497).

*Loranthus Europaeus* L. Kurdistania Persica: supra pagum Režâb dit. Kaser-i-Şirîn prope Hanikîn, ad *Quercum persicam* alt. ca. 1700 *m*. 5. V. 1910 (No. 450); Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: vallis Châne inter pagos 'Ain Nûne et Haşîtha, ad *Quercum infectoriam* alt. ca. 1450 *m*. 21. VI. 1910 (No. 4507); Kurdistaniae distr. Ramorân: supra pagum Hadîde ad orientem ab oppido S'ert, ad *Quercus* sp. alt. ca. 650 *m*. 17. VII. 1910 (No. 4506).

*L. Grewinkii* Boiss. et Buhse. Kurdistania Persica: supra pagum Režâb dit. Kaser-i-Şirîn prope Hanikîn, ad *Acerem cinerascens* alt. ca. 1800 *m*. 5. V. 1910 (No. 4509).

*L. Acaciae* Zuccar. Palaestina: El-Rôr dit. Jericho, ad *Zizyphum Spinam Christi* alt. ca. -300 *m*. 15. IV. 1909 (No. 4508); ad 'Ain Ğidi (Engaddi) ad litus occidentale Maris Mortui, ad *Zizyphum* Sp. Chr. alt. ca. -200 *m*. 26. V. 1909 (No. 4508a).

### Cytinaceae.

*Pilostyles Haussknechtii* Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: Ğelo-Dar dit. Ğulamerek, tentoria aestiva Djezra, ad *Astragalum adscendentem* alt. ca. 2500 *m*. 4. IX. 1910 (No. 3101).

### Aristolochiaceae.

*Aristolochia Olivieri* Collegno = *A. Maurorum* L. var. *Olivieri* (Coll.) Bornm. (Pl. Strauss. IV, p. 90). Kurdistania Persica: ad pagum Režâb dit. Kaser-i-Şirîn prope Hanikîn, in humosis alt. ca. 1400 *m*. 5. V. 1910 (No. 1191).

*A. Maurorum* L. Judaea: Wâdi es-Sunnâr et Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, inter segetes alt. 600—700 *m*. 22. et 25. III. 1909 (No. 1194 et 1195).

*A. Maurorum* L. var. *latifolia* Boiss., = *A. Bottae* Jaub. et Sp. Kurdistaniae Turcicae distr. Şerizor: Kurruk-Dar et Handrian-(Hândarin-)Dar prope Rewanûz dit. Erbil (Arbela), in humosis alt. 1600—1700 *m*. 22. et 23. V. 1910 (No. 1189 et 1190).

*A. paecilantha* Boiss. Judaea: En-nebi Samwîl dit. Hierosolymorum, inter segetes alt. ca. 800 *m*. 3. IV. 1909 (No. 1192); ad pagum Latrûn dit. Hierosolymorum, inter segetes alt. ca. 600 *m*. 3. IV. 1909 (No. 1193).

### Euphorbiaceae.

*Euphorbia Peplis* L. Mesopotamia: oppidum Amara ad Tigridem, in hortis irrigatis. 30. III. 1910 (No. 1237).

*E. Chamaesyce* L. Kurdistania Turcica: ad pagum Mâr Jakub



supra pagum Simel dit. Mōšul, in vineis alt. ca. 700 *m.* 10. VI. 1910 (No. 1226); ad pagum Chandūk ad Tigridem dit. Hassan Kef (Hisn Keifa), in agris sterilibus alt. ca. 350 *m.* 12. VII. 1910 (No. 1228); ad pagum Mâr Gorja dit. S'ert, in agris alt. ca. 1000 *m.* 16. VII. 1910 (No. 1227).

*E. Larica* Boiss. Persia australis: ad Bušîr (Abu Šehr) culta. 25. I. 1910 (No. 4423).

*E. lanata* Sieb. Moab: Wâdi ez-Zerka dit. Mādaba, ad terram nudam lapidosam alt. ca. 550 *m.* 28. VI. 1909 (No. 1256); Mesopotamia: ad Mōšul, in ripa Tigridis alt. ca. 250 *m.* 30. V. 1910 (No. 1257); Kurdistania Turcica: ad pagum Mâr Jakub dit. Mōšul, in vineis alt. ca. 700 *m.* 10. VI. 1910 (No. 1255); ad pagum Mâr Jakub dit. S'ert, in agris alt. ca. 800 *m.* 12. VII. 1910 (No. 1254).

*E. megalantha* Boiss. Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in agris inter segetes alt. ca. 2000 *m.* 1. VIII. 1910 (No. 1214); Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkîari: in valle fluv. Zab infra pagum Kočânes dit. Ğulamerik, in humosis lapidosis alt. ca. 2100 *m.* 29. VIII. 1910 (No. 1250).

*E. megalantha* Boiss. var. nova **brevicaulis** m. [Pag. 8, fig. 4], *Caules abbreviati, paulo supra solum umbellam 2—5-radiatam gerentes, cuius radii pluries dichotomi, elongati, usque 40 cm longi. Caules etiam fructiferi fructibus maturis ramis sterilibus carentes. Folia caulina emarcida, folia umbellaria, infima e basi subcordata ramos semiamplexantes late ovata, brevissime acuminata, acuta, integra, ca. 3 cm lata et aequilonga, superiora sensim diminuta, pro longitudine angustiora. Bractee inferiores oblongae aut lanceolatae, acutae, basi non dilatata sed angustata sessiles, ca. 1—1.5 cm longae et 0.5 cm latae. Bractee summae valde diminutae, solum 1.5 mm longae. Involucri forma, lobis elongatis, glandulis, capsulis et seminibus cum formis typicis congruens. Crescit cum formis typicis in Tauro Armeno ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in agris inter segetes alt. ca. 2000 *m.* 31. VII. 1910 (No. 1213).*

*E. arguta* Soland. Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma. inter segetes alt. ca. 650 *m.* 24. III. 1909 (No. 1239); Planities Esdrelon: ad Tell-el-Mutesselim (Megiddo) dit. Ğenin, in graminosis. 6. V. 1909 (No. 1238).

*E. Gaillardoti* Boiss. Mesopotamia superior (Ğebel et-Tur), ad oppidum Midiat, in agris sterilibus alt. ca. 1050 *m.* 10. VII. 1910 (Nr. 1211); ad pagum Chandūk ad Tigridem dit. Hassan Kef (Hisn Keifa), in agris sterilibus alt. ca. 350 *m.* 11. VII. 1910 (No. 1210).

*E. microsphaera* Boiss. Mesopotamia: oppidum Amara ad Tigridem, in hortis frequens. 30. III. 1910 (No. 1209).

*C. Cybirensis* Boiss. Judaea: ad pagum Bêt Ğemâl dit. Hierosolymorum, in agris alt. ca. 500 *m.* 6. IV. 1909 (No. 1224). Galilaea: 'Ain

Tine prope Tiberiadem, in ripa lacus alt. ca. -200 *m.* 22. IV. 1909 (No. 1240).

*E. Orientalis* L. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: mons Maidanoke supra pagum Hašitha dit. Ğulamerik, in humosis humidis alt. ca. 2000 *m.* 21. VI. 1910 (No. 1229). Kurdist. distr. Šerizor: Kurruk-Dar prope Rewandûz, in humosis alt. ca. 1600 *m.* 22. V. 1910 (No. 1229 a).

*E. macrocarpa* Boiss. et Buhse. Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Kašr-i-Širîn prope Hanikîn, in humosis humidis ad nives alt. ca. 1700 *m.* 5. V. 1910 (No. 1221); Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: Kurruk-Dar prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), alt. 1600—1700 *m.* 22. V. 1910 (No. 1222).



Fig. 4.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

*Euphorbia megalantha* Boiss. var. *brevicaulis* Nk. 1. Semen. 2. Involucrum. 3. Glandula.

4. Folia umbellaria infima. 5. Bracteae. 1—3 ca.  $\frac{5}{11}$ , 4 ca.  $\frac{1}{2}$ , 5 ca.  $1\frac{3}{4}$ .

*E. cardiophylla* Boiss. et Heldr. Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Kašr-i-Širîn prope Hanikîn, in quercetis alt. 1500—1700 *m.* 5. V. 1910 (No. 1251).

*E. thamnoides* Boiss. Judaea: Wâdi es-Sunnâr prope Hierosolyma, inter rupes alt. ca. 700 *m.* 25. III. 1909 (No. 1219).

*E. pubescens* Vahl. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: inter pagos Aradên et 'Ain Nûne dit. Amadia, ad fontem alt. ca. 1200 *m.* 15. VI. 1910 (No. 1220).

*E. helioscopia* L. Persia australis: ad pagum Hawîze ad radices montium Kuh Chormûğ dit. Bušîr (Abu Šehr). 17. II. 1910 (No. 1231); Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Šelelat dit. Šuštâr, in ripa fluvii Âb-i-Girgir (Kârûn) in agris frequentissima. 9. III. 1910 (No. 1230.)

*E. Aleppica* L. Judaea: ad pagum El-Kubebe (Emaus) dit. Hierosolymorum, in agris alt. ca. 700 *m.* 26. VII. 1909 (No. 1233). Kurdistania Turcica: ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môşul, in vineis alt. ca. 800 *m.* 9. VI. 1910 (No. 1232).

*E. exigua* L. Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, in agris alt. ca. 650 *m.* 24. III. 1909 (No. 1236).

*E. falcata* L. Kurdistania Persica: Ƙasr-i-Širîn dit. Hanikîn, in marginibus agrorum alt. ca. 400 *m.* 7. V. 1910 (No. 1241); Kurdistania Turcica (Assyria): Ğebel Neft prope Kerkuk, ad fontes naphtae alt. ca. 350 *m.* 17. V. 1910 (No. 1243).

*E. aulacosperma* Boiss. var. *fossulata* Boiss. Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, in agris alt. ca. 650 *m.* 24. III. 1909 (No. 1245 a).

*E. chamaepeplus* Boiss. et Gaill. Cum praecedenti. 24. III. 1909 (No. 1245).

*E. Szowitsii* Fisch. et Mey. Kurdistania Turcicae distr. Hakkiari: mons Dwîle supra pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, in graminosis siccis alt. ca. 1800 *m.* 18. VI. 1910 (No. 1244); ad pagum Mâr Jakub dit. S'ert, in agris alt. ca. 800 *m.* 12. VII. 1910 (No. 1242).

*E. cheiradenia* Boiss. et Hoh. (= *E. bothriosperma* Boiss. et Ky., cf. Handel-Mazzetti, Pteridoph. u. Anthoph. aus Mesopotam... p. 138). Arabia Petraea: El-Bêga inter Eš-Šôbak et Elġi (Wâdi Mûsa, Petra), inter rupes calcar. alt. ca. 650 *m.* 18. VI. 1909 (Nr. 1212. Determ. Dr. Handel-Mazetti.) Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in agris alt. ca. 2000 *m.* 1. VIII. 1910 (No. 1253).

*E. Gerardiana* Jacq. Taurus Armenus: Topra Kaleh prope Wan, in agris alt. ca. 2000 *m.* 17. VIII. 1910 (No. 1252).

*E. virgata* W. K. var. *Orientalis* Boiss. Kurdistania Turcicae distr. Hakkiari: ad pagum Hašîtha dit Ğulamerik, mons Dwîle, in humosis lapidosis alt. ca. 1800 *m.* 18. VI. 1910 (No. 1246) mons Siars, in humosis alt. ca. 1700 *m.* 19. VI. 1910 (No. 1247); Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in agris alt. 1900—2000 *m.* 1. VIII. 1910 (No. 1248).

*E. macroclada* Boiss. (= *E. tinetoria* Boiss. et Huet.) Kurdistania Persica: ad rupes calcar. supra pagum Sar-i-Pûl dit. Ƙasr-i-Širîn prope Hanikîn, alt. ca. 700 *m.* 6. V. 1910 (No. 1218).

*E. macroclada* Boiss. var. *schizoceras* Boiss. forma capsulis tomentellis. Kurdistania Turcicae distr. Berwari: ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môşul, inter rupes calcar. alt. 600—900 *m.* copiosa. 10. VI. 1910 (No. 1216); ad pagum Bâbuchki in valle Sapna inter Amadia et Zacho (Azach), in lapidosis alt. ca. 700 *m.* 24. VI. 1910 (No. 1215); Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in rupestribus alt. ca. 1900—2000 *m.* I. VIII. 1910 (No. 1217).

*E. Paralias* L. Phoenicia: ad pagum Ekzîb dit. Akka, in litore. 30. IV. 1909 (No. 1225).

*E. denticulata* Lehm. Kurdistania Persica: ad pagum Režâb dit. Ƙasr-i-Širîn prope Hanikîn, in lapidosis alt. ca. 1000 *m.* 5. V. 1910 (No. 1235). Taurus Armenus: ad pagum Gurundašt inter Šattak et Wan, in agris alt. ca. 2000 *m.* 1. VIII. 1910 (No. 1234).



**E. (Poinsettia) heterophylla** L. var. *cyathophora* Boiss. Judaea: Hierosolyma, in hortis. 19. VIII. 1909 (No. 1223).

**Andrachne telephioides** L. var. *rotundifolia* (C. A. Mey.) J. Müll. Judaea: Hierosolyma, ad muros, 12. IV. 1909 (No. 1200); Wâdi Bêt Hanîna dit. Hierosolymorum, in rupestribus alt. ca. 700 *m.* 26. III. 1909 (No. 1199).

**A. telephioides** L. var. *virescens* (Stapf) Bornm. Kurdistania Persica: Kaşr-i-Şîrîn dit. Hanikîn, in lapidosis alt. ca. 400 *m.* 7. V. 1910 (No. 1198); Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Salahîje (Kifri), ad rupes gypsaceas Şech Zoar, alt. ca. 350 *m.* 10. V. 1910 (No. 1197).

**Crozophora tinctoria** (L.) Juss. Kurdistania Turcica: ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Mûşul, in vineis alt. ca. 600 *m.* 10. VI. 1910 (No. 1206); ad pagum Mâr Jakub dit. S'ert, in agris alt. ca. 800 *m.* 12. VII. 1910 (No. 1205); Armenia Turcica: ad pagos Choşmat et Habusi inter oppida Muş et Charput, in agris cultis et sterilibus alt. ca. 100 *m.* frequens. 1. et 2. X. 1910 (No. 1207 et 1208).

**C. verbascifolia** (Willd.) Juss. Judaea: 'Ain Ğidi (Engaddi) ad litus occidentale Maris Mortui, alt. ca. -250 *m.* 26. V. 1909 (No. 1204); Moab: Wâdi ez-Zerka dit. Mâdaba, alt. ca. 450 *m.* 27. VI. 1909 (No. 1202); Mesopotamia: Mûşul, in ripa Tigridis alt. ca. 250 *m.* 30. V. 1910 (No. 1203).

**Mercurialis annua** L. Galilaea: 'Ain Tabra prope Tiberiadem, ad fontes alt. ca. -200 *m.* 22. IV. 1909 (No. 1196).

**R. cinus communis** L. Palaestina: ad pontem Jordanis prope Jericho, alt. ca. -350 *m.* 15. IV. 1909 (No. 1201).

### Urticaceae.

**Urtica urens** L. Mesopotamia: Babylon, leg. Dr. Reuter (No. 337).

**U. dioica** L. Kurdistaniae Turcae distr. Berwari: ad pagum Arad n in valle Sapna dit. Amadia, inter sepes alt. ca. 900 *m.* 14. VI. 1910 (No. 338).

**Parietaria Judaica** L. var. *brevipetiolata* Boiss. Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, inter rupes alt. ca. 700 *m.* 24. III. 1909 (No. 341); Kurdistania Turcica: ad pagum Mâr Gorîa ad orientem ab oppido S'ert, in fissuris rupium calcar. alt. 1000—1200 *m.*, forma *foliis maiusculis (maximis 15 mm longis et 12 mm latis), late ovatis, basi rotundatis aut subcordatis, petiolis tenuibus 5—6 mm longis suffultis.* 16. VII. 1910 (No. 342).

**P. alsinefolia** Delile. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, ad rivulum alt. ca. -200 *m.* 29. III. 1909 (No. 339); Kurdistania Persica: Kaşr-i-Şîrîn dit. Hanikîn, in lapidosis subumbrosis alt. ca. 400 *m.* 3. V. 1910 (No. 340).

**Forskanlea tenacissima** L. Judaea: 'Ain Ğidi (Engaddi) ad

litus occidentale Maris Mortui, ad rivulum alt. ca. -250 *m.* 26. V. 1909 (No. 343).

**Ficus** *Carica* L. var. *rupestris* Hausskn. Persia austro-occidentalis (Susiana): Siah-Kuh (Pušt i-Kuh) supra Deilerûn (Deh-i-Loran), ad rupes calcar. 25. III. 1910 (No. 335); Kurdistania Turcica: ad pagum Maltai inter pagos Tell Kef (Tell-is-Kof) et Simel dit. Mîşul, ad rupes calcar. alt. ca. 500 *m.* 6. VI. 1910 (No. 333).

*F. Carica* L. var. *rupestris* Hausskn. foliis supra asperis, subtus tomentello-scabris ad var. *Johannis* Boiss. accedens, sed laminis indivisis, grosse repando-dentatis. Kurdistania Persica: ad rupes supra pagum Sar-i-Pul dit. Qasr-i-Şîrîn, alt. ca. 550 *m.* 4. V. 1910 (No. 334); supra pagum Režâb eiusdem ditionis, ad rupes alt. 800—900 *m.* 5. V. 1910 (No. 334a).

*F. laccifera* Wight. Persia australis: Buşîr (Abu Şehr), arbor elata, culta. 25. I. 1910 (No. 336).

**Celtis** *Caucasica* Willd. Kurdistania Persica: in pago Režâb dit. Qasr-i-Şîrîn prope Hanikîn, alt. ca. 800 *m.*, arbor elata, culta. 5. V. 1910 (No. 194).

*C. Tournefortii* Lam. var. *glabrata* (Stev.) Boiss. Armenia Turcica: ad pagum Gözena inter oppida Malatia et Mar'as, alt. ca. 900—1000 *m.* arbuscula formans. 9. X. 1910 (No. 193).

**Zelkoua** *crenata* (Desf.) Spach. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: ad pagum Berka prope pagum Dehok ad orientem ab oppido S'ert, in querceto alt. ca. 900 *m.* 21. VII. 1910 (No. 75).

### Juglandaceae.

**Juglans** *regia* L. Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Qasr-i-Şîrîn prope Hanikîn, in convalle ad rivum alt. ca. 1500 *m.* arbores elatae silvulam formantes.

**Pterocarya** *fraxinifolia* (Lam.) Spach. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: ad rivum prope pagum Bengof dit. Dehok, ad orientem ab oppido S'ert, alt. ca. 800 *m.* arbores nonnullae mediocres. 20. VII. 1910 (No. 52).

### Platanaceae.

**Platanus** *Orientalis* L. Kurdistaniae Turcicae distr. Şerizor et distr. Berwari, in vallibus profundis humidis cum *Salicum* sp., *Crataegi* sp. et *Quereuum* sp. silvulas format. In valle Sapna inter Azach (Zacho) et Amadia, ad pagum Aradên, alt. ca. 900 *m.* 15. VI. 1910 (No. 344); Armenia Turcica: ad pagum Nağarli dit. Mar'as, ad rivum alt. ca. 800 *m.* 13. X. 1910 (No. 345).

### Cupuliferae.

**Quercus** *pedunculata* Ehrh. Armenia Turcica: inter vicum Hağî Ahmad et fluv. Gunik-Su (inter oppida Muş et Charput), alt. ca.



1200 *m*, arbores mediocres. 28. IX. 1910 (No. 2063 et No. 2080, forma foliis profundius in lobos angustiores fissis).

*Q. sessiliflora* Sm. Armenia Turcica: in montibus inter oppida Muš et Charput arborea, inter vicum Haği Ahmad et fluv. Gunik-Su, alt. ca. 1200 *m*. 29. IX. 1910 (No. 2076).

*Q. sessiliflora* Sm. var. *Cedrorum* A. DC. (= *Q. Cedrorum* Ky.) Armenia Turcica: ad pagum Ćabachĉūr inter Malatia et Mar'aš, alt. ca. 1000 *m* fruticosa sterilis frequens. 30. IX. 1910 (No. 2066).

*Q. sessiliflora* Sm. var. *mannifera* Boiss. (= *Q. mannifera* Lindl.) Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: in valle Âv Koĉânes infra pagum Koĉânes dit. Ğulamerik, arborea humilis, alt. ca. 1400 *m*. 6. IX. 1910 (Nr. 2058); Armenia Turcica: supra pagum Ćabachĉūr inter Muš et Charput, alt. ca. 1200 *m*, arborescens. 30. IX. 1910 (No. 2077 et 2079).

*Q. infectoria* Oliv. (= *Q. Lusitanica* Boiss.) Libanon: ad pagum Brumâna supra Beirut, alt. ca. 700 *m* fruticosa et arbores humiles formans. 15. X. 1909 (No. 2088). Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: in valle Sapna inter Zacho (Azach) et Amadia, alt. ca. 700—1000 *m* fruticosa frequens. 23. VI. 1910 (No. 2064); Kurdistaniae distr. Ramorân: ad pagum Dehok ad orientem ab oppido S'ert, alt. ca. 1100 *m*, fruticosa et arborescens humilis, forma *foliis parvis*, ( $6 \times 3 - 2.5 \times 1.25$  cm) *latiuscule obovatis, dentibus prorsus spectantibus*. 23. VII. 1910 (No. 2093 a); mons Mirgamira ad pagum Šernach ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, arborescens humilis alt. ca. 1250 *m*. 24. VII. 1910 (No. 2091, forma parvifolia); Armenia Turcica: frequens in montibus inter oppida Muš et Charput, fruticosa et arborescens. Inter vicum Haği Ahmad et fluv. Gunik-Su, alt. ca. 1200 *m*. 29. IX. 1910 (No. 2067, 2078 et 2090); ad pagum Ćabachĉūr, alt. ca. 1300 *m*. 30. IX. 1910 (No. 2056).

*Q. infectoria* Oliv. var. *petiolaris* DC. (= *Q. Pfaeffingeri* Ky.) Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: ad pagum Kân-i-Watman inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, alt. ca. 900 *m* fruticosa. 21. V. 1910 (No. 2094), ad pagum Baba Ğġik eiusdem ditionis, alt. ca. 950 *m*. 21. V. 1910 (No. 2057); Kurdistaniae distr. Berwari: in valle Nazarki prope pagum Mâr Jakub dit. Mûsul, fruticosa et arborescens, alt. ca. 800 *m*. 28. VI. 1910 (No. 2092); Kurdist. distr. Ramorân: ad pagum Dehok ad orientem ab oppido S'ert, alt. ca. 1100 *m*, arborescens humilis. 23. VII. 1910 (No. 2093).

*Q. infectoria* Oliv. var. *latifolia* Boiss. (= *Q. Syriaca* Ky.) Judaea: El-Kubebe (Emaus) dit. Hierosolymorum, fruticosa, alt. ca. 750 *m*. 26. VII. 1909 (No. 2089). Palaestina orientalis (Gilead): ad pagum Ğeraš (Gerasa) alt. ca. 500 *m*. 18. IV. 1909 (No. 2051); Libanon: in pago Brumâna supra Beirut, arbor elata. 23. X. 1909 (No. 2065).

*Q. coccifera* L. var. *calliprinos* Boiss. (= *Q. calliprinos*

Webb.) Arabia Petraea: El-Hôr inter Eš-Šôbak et Elġi (Petra, Wâdi Mûsa), fruticosa, alt. ca. 800 *m*. 18. VI. 1909 (No. 2068).

*Q. coccifera* L. var. *pseudococcifera* Boiss. (= *Q. pseudo-coccifera* Desf.) Judaea: Wâdi 'Ali prope Hierosolyma, alt. ca. 650 *m*, 2. IV. 1909 (No. 2073), Tell Zacharia dit. Hierosolymorum, alt. ca. 350 *m*, 7. IV. 1909 (No. 2072), El-Kubebe (Emaus) dit. Hierosolymorum, alt. ca. 750 *m*. 26. VII. 1909 (No. 2070 et 2074), ad Hebron alt. ca. 800 *m*, 27. V. 1909 (No. 2075); Palaestina orientalis (Gilead): ad Ġeraš (Ġerasa) alt. ca. 500 *m*, 19. IV. 1909 (No. 2071); Libanon: ad pagum Brumâna supra Beirut, alt. ca. 700 *m*. 18. X. 1909 (No. 2069).

*Q. Cerris* L. var. *pseudocerris* Boiss. (= *Q. Vallonea* Ky.) Armenia Turcica: ad pagum Gôzena inter Malatia et Mar'as, alt. ca. 1050 *m* frequens, frutices altas formans. 10. X. 1910 (No. 2053); ad pagum Melanli eiusdem ditionis, alt. ca. 900 *m*, arborea. 13. X. 1910 (No. 2054).

*Q. Brantii* Lindl. (= *Q. oophora* Ky.) Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: ad pagum Baba Ġġġik inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, alt. ca. 900 *m* frequens, fruticosa. 21. V. 1910 (No. 2059). Kurdistaniae distr. Berwari: vallis Châne ad pagum 'Ain Nûne inter Hašîtha et Amadia, alt. ca. 1400 *m* frequens, fruticosa et arborescens humilis. 21. VI. 1910 (No. 2060); ad pagum Mongeš in valle Sapna inter Zacho (Azach) et Amadia, alt. ca. 900—1000 *m*, fruticosa et arborescens, 23. VI. 1910 (No. 2061); Armenia Turcica: ad vicum Haġi Ahmad inter Muš et fluv. Gunik-Su, alt. ca. 1200 *m*, frequens arborea. 29. IX. 1910 (No. 2062).

*Q. Libani* Oliv. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum 'Ain Nûne in valle Châne inter Hašîtha et Amadia frequens, fruticosa et arborea humilis, alt. 1000—1500 *m*. 21. VI. 1910 (No. 2086 et No. 2052, foliis profunde lobatis ad var. *pinnatam* Hand.-Mzt. accedens). Kurdistaniae distr. Ramorân: mons Mirgamira prope pagum Šarnach ad septentr. ab oppido Ġezîret-ibn-Ômar, alt. ca. 1400 *m*, arborescens humilis. 24. VII. 1910 (No. 2087); Armenia Turcica: ad vicum Haġi Ahmad inter Muš et fluv. Gunik-Su, alt. ca. 1200 *m*, frequens, arborea et fruticosa. 29. IX. 1910 (No. 2085). *Ex foliis huius imprimis speciei manna collegitur.*

*Q. Libani* Oliv. var. *pinnata* Hand.-Mzt. (Handel-Mazzetti: Pteridoph. u. Anthoph. aus Mesopotam.... p. 128) Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum 'Ain Nûne in valle Châne inter Hašîtha et Amadia, alt. ca. 1450 *m* fruticosa. 21. V. 1910 (No. 2055).

*Q. Persica* Jaub. et Sp. Persia austro-occidentalis (Susiana): Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) supra Dailerûn (Deh-i-Loran), ad rupes calcar. fruticosa. 25. III. 1910 (No. 2082). Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Ġasr-i-Šîrîn prope Hanikîn, alt. 1100—1400 arborea. 5. V. 1910 (No. 2081 et 2083).

## Salicaceae.

*Salix acmophylla* Boiss. Persia australis: pagus Hawize ad radices montium Kuh Chormûğ dit. Bušîr (Abu Šehr), ad fontem. 19. II. 1910 (No. 4427); Mesopotamia: oppidum Amara ad Tigridem, in ripa fluvii et ad fossas irrigationis. 30. III. 1910 (No. 4419, 4424, 4428, 4430); Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum 'Ain Nûne in valle Châne inter Hašîtha et Amadia, ad rivum alt. ca. 1500 *m*. 21. VI. 1910 (No. 4421).

*S. fragilis* L. Moab: Wâdi Môğib (Arnon), ad rivum alt. ca. 350 *m*. 25. VI. 1909 (No. 4429).

*S. alba* L. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: traiectus Šerderian inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, alt. ca. 1100 *m*. 24. V. 1910 (No. 4420).

*S. alba* L. var. *coerulea* (Sm.) Koch. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: Ğelo-Dar dit. Ğulamerik, in valle torrentis Howaraš alt. ca. 1200 *m*. 30. VIII. 1910 (No. 4418).

*S. purpurea* L. Galilaea: 'Ain Tine prope Tiberiadem, ad fontem alt. ca. -200 *m*. 22. IV. 1909 (No. 4422).

*S. angustifolia* Wild. Syria borealis: ad pagum Birinč in valle Arzakli dit 'Aintab, ad rivum alt. ca. 1250 *m*. 21. X. 1910 (No. 4417).

*S. Medemii* Boiss. f. *latifrons* Bornm. (Bornmüller, *Plantae Straussianae*, IV. p. 94) Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: vallis fluv. Zab dit. Kočânes, alt. ca. 1300 *m*. 5. IX. 1910 (No. 4426).

*S. Medemii* Boiss. f. *longifrons* Bornm. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: vallis rivi Âv Kočânes prope pagum Kočânes dit. Ğulamerik, alt. ca. 1450 *m*. 5. IX. 1910 (No. 4425).

*Populus tremula* L. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: ad pagum Čerme in valle fluv. Zab dit. Kočânes, ad fontem alt. ca. 1400 *m*. 5. IX. 1910 (No. 4409).

*P. Euphratica* Oliv. In valle Jordanis dit. Jericho alt. ca. -350 *m* frequens. 18. III. et 15. IV. 1909 (No. 4411 et 4415); in vallibus Moabiticis et Arabiae Petraeae ad rivos, Seil ed-Drâ inter Mâdaba et El-Kerak, 15. VI. 1909 (No. 4416). Mesopotamia: ad Dêr ez-Zor ad Euphraten, 14. XII. 1909 (Nr. 4412); Babylon, 18. IV. 1910 (No. 4413); Mohammera ad Šatt-el-Arab, 4. III. 1910 (No. 4410); Persia austro-occidentalis (Suisiana): in ripis fluv. Kercha ad ruinas Susorum, 22. III. 1910 (No. 4414).

*P. pyramidalis* Rozier. In Kurdistania et in Armenia ad pagos undique culta. Armenia Turcica: ad rivum Gunik-Su inter Muš et Charput, alt. ca. 1100 *m*. 29. IX. 1910 (No. 4408).



## Monocotyledoneae.

### Hydrocharitaceae.

**Vallisneria spiralis** L. Persia austro-occidentalis (Susiana): in fluv. Šaîr ad ruinas Susorum. 21. III. 1910 (No. 253).

### Alismaceae.

**Alisma Plantago** L. Persia austro-occidentalis (Susiana): in ripa fluv. Šaîr ad ruinas Susorum (? spec. nimis iuvenilia), 16. III. 1910 (No. 247); Mesopotamia: Babylon, leg. Dr. Renter (No. 44).

### Potamogetonaceae.

**Zannichellia palustris** L. Galilaea: ad Kades inter Šafed et Bânias (Caesarea Philippi), in fossa alt. ca. 100 *m.* 24. IV. 1909 (No. 249); Persia austro-occidentalis: in paludibus ad ruinas Susorum. 14. III. 1910 (No. 248).

**Potamogeton fluitans** Roth. Persia austro-occidentalis: in fluv. Šaîr ad ruinas Susorum. 17. III. 1910 (No. 246).

**P. pectinatus** L. Armenia Turcica: ad pagum Avanc prope Wan, in paludibus ad ripam lacus, 16. VIII. 1910 (No. 244).

**P. densus** L. Armenia Turcica: ad pagum Hirč dit. Wan, in fossa irrigationis alt. ca. 1800 *m.* 1. IX. 1910 (No. 245).

### Araceae.

**Biarum Carduchorum** (Schott) Engl. Armenia Turcica: ad pagum Sakrât dit. Mezere (Mamuret-ül-Aziz) alt. ca. 1100 *m.* 1. X. 1910 (No. 1013); ad oppidum Malatia alt. ca. 1000 *m.* 5. X. 1910 (No. 1012).

**Arum Dioscoridis** Sibth. et Sm. var. **Syriacum** Engl. Syria borealis: ad oppidum Mar'âš (No. 1021).

**A. Palaestinum** Boiss. Judaea: Wâdi 'Ali prope Hierosolyma, alt. ca. 500 *m.* 2. IV. 1909 (No. 1017); ad pagum Latrûn dit. Hierosolymorum, alt. ca. 300 *m.* 2. IV. 1909 (No. 1011). Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: Handrian-Dar prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in humosis alt. ca. 1500 *m.* Forma Kotschyi. 23. V. 1910 (No. 1019 et 1020).

**A. hygrophilum** Boiss. Palaestina orientalis: ad pagum Arak el-Emîr dit. 'Amnân, in fissuris rupium subhumidis et umbrosis alt. ca. 450 *m.* 15. IV. 1909 (No. 1018); ad pagum Ğeraš (Gerasa), in lapidosis alt. ca. 550 *m.* 18. IV. 1909 (No. 1016).

**Helicophyllum crassipes** (Boiss.) Schott. Phoenicia litoralis: in horto irrigato ad Es-Sur (Tyros). 29. IV. 1909 (No. 1015); planities Esdreton: in paludibus ad Tell-el-Mutesselim (Megiddo) dit. Ğenin. 6. V. 1909 (No. 1023).

**Arisarum vulgare** Targ. Syria litoralis: in fauce torrentis Nahr el-Kelb prope Beirût, in fissuris rupium subhumidis. 7. XI. 1910 (No. 1022).

## Typhaceae.

*Typha angustata* Bory et Chaub. Arabia Petraea: Seil-ed-Drâ inter El-Kerak et Eš-Šôbak, ad rivulum alt. ca. 300 *m.* 15. VI. 1909 (No. 921): El-Mezra'a, ad litus orientale Maris Mortui, alt. ca. -390 *m.* 14. VI. 1909 (No. 924).

## Orchideae.

Ordinis Orchidearum revisionem cl. **H. Fleischmann** exsecutus est.

*Loroglossum hircinum* (L.) Rich. [= *Aceras hircina* (L.) Crantz. *Himantoglossum hircinum* Spreng.] Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: ad pagum Kân-i-Watman inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in quercetis alt. ca. 900 *m.* 21. V. 1910 (No. 2271).

*Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. Judaea: ad pagum Beit Ġemâl dit. Hierosolymorum, in fruticetis alt. ca. 450 *m.* 6. IV. 1909 (No. 2270).

*Orchis papilionacea* L. Judaea: Wâdi ed-Ġôz prope Hierosolyma, in herbis lapidosus alt. ca. 700 *m.* 24. III. 1909 (No. 2257).

*O. coriophora* L.  $\beta$  *fragrans* Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: ad pagum Baba Ġiġik inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in graminosis alt. ca. 700 *m.* 20. V. 1910 (No. 2261).

*O. sancta* L. (det. H. Fleischmann). Palaestina orientalis (Haurân, Aġlûn): Wadi et-Tawahin ad fluv. Jabok dit. Ġeraš (Gerasa), in graminosis alt. ca. 400 *m.* 17. IV. 1909 (No. 2262).

*O. tridentata* Scop. (= *O. acuminata* Desf.) Judaea: in dit. Hierosolymorum frequens. Wâdi ed-Ġôz, Wâdi es-Sunnâr, Wâdi Bêt-Hanîna, alt. ca. 500—700 *m.* 24., 25., 26. III. 1909 (No. 2258, 2259, 2260).

*O. saccata* Ten. Kurdistania Persica: supra pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, in quercetis alt. ca. 1500—1700 *m.* 5. V. 1910 (No. 2256). Forma **maior** Fleischmann: *specimina robusta, usque 40 cm alta*. [„Außerordentlich große Exemplare, welche die Aufstellung einer fm. major vollaufberechtigten.“ H. Fleischmann in schedâ.] Cum praecedenti (No. 2256 a).

*O. mascula* L. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: Kurrük-Dar prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in humosis alt. ca. 1600 *m.* 22. V. 1910 (No. 2267); Handrian-(Händarin)-Dar eiusdem ditionis, in fruticetis humosis quercuum, acerorum et crataegorum alt. ca. 1800 *m.* 23. V. 1910 (No. 2268).

*O. Anatolica* Boiss. (det. H. Fleischmann). Judaea: Wâdi Bêt Hanîna prope Hierosolyma, in lapidosus alt. ca. 650 *m.* 26. III. 1909 (No. 2264). Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, in humosis alt. 1500—1700 *m.* 5. V. 1910 (No. 2265 et 2266).

*O. palustris* Jacq. Persia austro-occidentalis: ad ripas paludosas fluv. Šâûr ad ruinas Susorum. 15. III. 1910 (No. 2254); Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: ad pagum Kân-i-Watman inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, ad rivulum alt. ca. 700 *m.* 24. V. 1910 (No. 2269).



*O. latifolia* L. sensu amplissimo, f. *Nábělekii* Fleischm. [in scheda: „Die Pflanze ist leider ohne Knollen. Ich habe sie vergeblich in eine der Klinge'schen Formen unterzubringen versucht. Im Herbar des Wiener Staatsmuseums ist die Pflanze nur in einer einzigen annähernden Form vorhanden mit der Etikette: ‚Th. Kotschy, Plantae Persiae borealis No. 814. Orchis... Ad pagum Derbent prope Teheran.‘ Dieses Individuum ist leider auch ohne Knollen, so daß die Zugehörigkeit zur *latifolia*- oder *sambucina*-Gruppe nicht zu lösen ist. *Die spitzigen Blätter weisen allerdings zur latifolia*-Gruppe, Sect. (Traunsteineri) *angustifoliae*. Man könnte die Pflanze daher am besten *Orchis latifolia* L. im weitesten Sinne, fma *Nábělekii* nehmen.“ Fleischmann.] Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: prata humida supra pagum Hašitha dit. Ğulamerik, alt. ca. 1600 *m.* 18. VI. 1910 (No. 2263).

*O. sambucina* L. sensu amplissimo [in scheda: „Zur Orchis *sambucina*-Gruppe gehörend, doch nicht die typische Form. Der Sporn kürzer und viel enger.“ Fleischmann.] Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: prata humida supra pagum Hašitha dit. Ğulamerik, alt. ca. 1600 *m.* [Specimen unicum.] 18. VI. 1910 (No. 2255).

*Ophrys* *lutea* Cav. Judaea: ad Latrûn dit. Hierosolymorum, in saxosis subhumidis alt. ca. 300 *m.* 3. IV. 1909 (No. 2247).

*O. carmelensis* Fleischmann. Judaea: Wâdi ed-Ğôz dit. Hierosolymorum, inter *Poterium spinosum* L. alt. ca. 650 *m.* 24. III. 1909 (No. 2246).

*O. Schulzei* Bornmüller et Fleischmann [Mitteil. Thüring. Bot. Ver. n. F. XXVIII. p. 60]. Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Ķasr-i-Šîrîn, in quercetis humosis alt. ca. 1500—1700 *m.* 5. V. 1910 (No. 2250 et 2251); Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: ad pagum Kân-i-Watman inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in quercetis alt. ca. 900 *m.* 22. V. 1910 (No. 2252).

*O. Bornmülleri* M. Schk. Judaea: ad pagum Aslîn prope Dêr Abân dit. Hierosolymorum, alt. ca. 500 *m.* 6. IV. 1909 (No. 2249); ad pagum Silo (Sêlûn) inter Nâbulus et Hierosolyma, alt. ca. 350 *m.* 9. V. 1909 (No. 2248).

*O. Straussii* Fleischmann. Kurdistania Persica: supra pagum Režâb dit. Ķasr-i-Šîrîn, in quercetis humosis alt. ca. 1500 *m.* 5. V. 1910 (No. 2253).

*Cephalanthera* *Kurdica* Bornm. et Kraenzl. [Bull. Herb. Boiss. III. p. 143]. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: ad pagum Kân-i-Watman inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in querceto alt. ca. 900 *m.* 21. V. 1910 (No. 2245).

*Epipactis* *latifolia* All. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: ad pagum ‘Ain Nûne inter pagos Amadia et Hašitha, in quercetis alt. ca. 1200 *m.* 16. VI. 1910 (No. 2243).

*E. veratrifolia* Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: in valle Sapna inter Zacho (Azach) et Amadia, inter frutices quercuum alt. ca. 650 *m.* 15. VII. 1920 (No. 2244).

**Limodorum abortivum** L. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: ad pagum Kân-i-Watman inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in quercetis aridis alt. ca. 900 *m.* 22. V. 1910 (No. 2241); Kurdistan. distr. Hakkari: mons Choarra-Sia supra pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, in quercetis alt. ca. 1600 *m.* 16. VI. 1910 (No. 2242).

**Spiranthes autumnalis** Rich. Libanon: ad monasterium Mâr Šâja prope pagum Brumâna supra Beirût, in silva Pini Halepensis alt. ca. 800 *m.* 12. X. 1910 (No. 2240).

### Iridaceae.

**Crocus ochroleucus** Boiss. et Gaill. Libanon: ad pagum Brumâna supra Beirût, in vineis alt. ca. 700 *m* frequentissimus. X. 1909 (No. 2238).

*C. Haussknechtii* Boiss. et Reut. Syria borealis: in agris inter Killis et Haleb (Aleppo), in agris alt. ca. 450 *m.* 22. X. 1910 (No. 2236).

*C. cancellatus* Herb. Armenia Turcica: ad pagum Kermechdi dit. Malatia, in vinea alt. ca. 1000 *m.* 9. X. 1910 (No. 2237).

*C. vitellinus* Wahl. Libanon: ad pagum Brumâna supra Beirût, in vineis et in fissuris rupium alt. ca. 750 *m.* X. 1909 (No. 2239).

**Iris Sisyrinchium** L. Persia australis: ad pagum Hawîze dit. Bušîr (Abu Šehr), ad pedes montium Chormûĝ, ad fontem 19. II. 1910 (No. 2229). Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Kaunak (Kônak) inter Šuštâr et Dizfûl, ad fossas irrigationis copiosissima. 12. III. 1910 (No. 2230). Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Ķasr-i-Šîrîn, in lapidosis alt. ca. 1200 *m.* 5. V. 1910 (No. 2227). Judaea: in ditione Hierosolymorum undique frequens. Wâdi ed-Ĝôz, alt. ca. 600—700 *m.* 24. III. 1909 (No. 2228).

*I. Persica* L. Syria borealis: ad oppidum Mar'as (No. 2231); Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: Kurruk-Dar prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in lapidosis alt. ca. 1600 *m* (? fructifera). 22. V. 1910 (No. 2235).

*I. Florentina* L. Kurdistania Persica: ad pagum Režâb dit. Ķasr-i-Šîrîn, inter sepulcra et in fruticetis alt. ca. 900 *m* verisimiliter culta et spontanea. 4. V. 1910 (No. 2234).

*I. pallida* Lam. Palaestina septentrionalis: supra pagum Bânias (Caesarea Philippi) in fauce humida Hermonis, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 700 *m.* 26. IV. 1909 (No. 2233).

**Gladiolus segetum** Gawl. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: mons Siâres supra pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, in graminosis alt. 1700—1800 *m.* 19. VI. 1910 (No. 2225 et 2226).

*G. Illyricus* Koch  $\beta$  *Anatolicus* Boiss. Persia austro-occidentalis (Susiana): ad ripas fluvii Kercha in ditione Susorum, inter segetes. 22. III. 1910 (No. 2221).

*G. imbricatus* L.  $\beta$  *Kotschyanus* Boiss. Kurdistaniae Turcaeae distr. Šerizor: inter pagos Dêr Harîr et Baba Ğiğik dit. Erbil (Arbela)-Rewandûz, in graminosis subhumidis alt. 800—900 *m.* 20. V. 1910 (No. 2220 et 2224).

*G. atrovioleaceus* Boiss. Judaea, in ditione Hierosolymorum inter segetes alt. 400—700 *m* frequens. Wâdi ed-Ğôz, 24. III. 1909 (No. 2222), W. es-Sumâr 25. III. 1909 (No. 2219), Bêt Ğemâl 6. IV. 1909 (No. 2223).

### Amaryllidaceae.

*Sternbergia Clusiana* Gawl. Syria borealis: ad oppidum Killiz, in agris alt. ca. 650 *m*, 22. X. 1910 (No. 2218), et inde in agris et in steppis usque ad oppidum Haleb (Aleppo). Monti Isoletti ad Aleppo, in agris alt. ca. 400 *m* frequens. 29. X. 1910 (No. 2217).

*Narcissus Tazetta* L.  $\beta$  *Syriacus* Boiss. Syria: ad torrentem Nahr et-Kelb dit. Beirût, in fissuris rupium ad litus. 17. XI. 1910 (No. 2216); ad pagum Brumâna supra Beirût, inter rupes alt. ca. 700 *m*. 22. X. 1909 (No. 2215). Persia australis: ad oppidum Bušîr, inter segetes ad Mašîla, forma *humilior*, *scapo paucifloro*, *floribus parvis*. 26. I. 1910 (No. 2214).

*Ixiolirion montanum* (Labill.) Herb. Palaestina orientalis: ad pagum 'Ammân (Rabbath Ammon), in agris alt. ca. 800 *m*. 16. IV. 1909 No. 2206). Kurdistania Turcica (Assyria): Ğebel Kumataš (Hamrîn) inter Kezrabad et Hanikîn, in steppa alt. ca. 300 *m*. 3. V. 1910 (No. 2212). Kurdistania Persica: supra pagum Režâb, in graminosis alt. ca. 1400 *m*. 5. V. 1910 (No. 2213). Kurdistaniae Turcaeae distr. Šerizor: Kurruk-Dar prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in graminosis ad fontem alt. ca. 1600 *m*. 22. V. 1910 (No. 2207); Armenia Turcica: ad oppidum Malatia leg. Fr. Anastase Cadell (No. 2208).

*J. Pallasii* Fisch. et Mey. Persia austro-occidentalis (Susiana): ad ripas fluv. Dweriĉ (Duweiriĉ) inter Susa et Deilerûn (Deh-i-Loran). 24. III. 1910 (No. 2209); in steppis in aridissimis inter Deilerûn et colles Kuh Beijât (Ğebel Hamrîn) frequens. 24. III. 1910 (No. 2210 et 2211).

### Colchicaceae.

*Colchicum laetum* Stev. Libanon: ad pagum Brumâna supra Beirût. in saxosis alt. ca. 800 *m*. 22. X. 1909 (No. 2202). Syria borealis: ad pagum Akseraj inter Perveri et Mar'as, in collibus aridis alt. ca. 850 *m*. 13. X. 1910 (No. 2201 et 2203, forma laciniis acutissimis).

*C. Haussknechtii* Boiss. Syria borealis: colles ad pagum Ak-Serai inter Perveri et Mar'as, alt. ca. 1100 *m*. 13. X. 1910 (No. 2203).



*C. candidum* Schott et Ky. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: Ğelo-Dar prope pagum Kočânes dit. Ğulamerik, in pascuis alpinis alt. 1800—2000 *m.* 7. IX. 1910 (No. 2205); ad pagum Kočânes, in querceto alt. ca. 1700 *m.* 6. IX. 1910 (No. 2204).

*C. Turcicum* Janka (? , specimina fructifera). Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Kaunak inter Šuštâr et Dizfûl 12. III. 1910 (No. 2192); ad ruinas Susorum, in agris. 17. III. 1910 (No. 2191 et 2193).

*C. montanum* L. Persia australis: Kuh Chormûğ dit. Bušîr (Abu Šehr), in regione summa. 18. II. 1910 (No. 2198).

*C. Steveni* Kunth. Libanon: ad pagum Brumâna supra Beirût, in vineis et ad vias alt. ca. 800 *m* frequentissimum. 22. X. 1909 (No. 2199); Râs Beirût prope Beirût, ad vias. 3. XI. 1910 (No. 2200).

*C. crocifolium* Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: inter pagos Dêr Harîr et Baba Ğîğîk dit. Erbil (Arbela)-Rewandûz, in steppa alt. ca. 700 *m.* 20. V. 1910 (No. 2195).

**Merendera** Kurdica Bornm. [Bornmüller, Mitt. Thür. Bot. Ver. n. F. VII (1895) p. 7.] Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: mons Maidanoke supra pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, ad nives alt. ca. 2100 *m.* 20. VI. 1910 (No. 2196); Kurdistania Persica: supra pagum Režâb dit. Ğasr-i-Šîrîn, in humosis alt. ca. 1750 *m* (? fructifera). 5. V. 1910 (No. 2194).

### Liliaceae.

**Fritillaria latifolia** W. Spec. var. *Kotschyana* Boiss. (= *F. Kotschyana* Herb. Bot. Reg.) forma pluriflora (2—3-flora). Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Ğasr-i-Šîrîn, in humosis alt. ca. 1700—1800 *m.* 5. V. 1910 (No. 2170 et 2171); Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: mons Maidanoke supra pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, in herbidis alt. ca. 1700 *m.* 19. VI. 1910 (? fructifera, No. 2167).

*F. aemopetala* Boiss. (? , omnia specim. fructifera, caules 1—2-flori). Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: mons Siales supra pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, in graminosis alt. 1600—1800 *m.* 18. VI. 1910 (No. 2175); mons Maidanoke eiusdem dit. alt. 1600—1700 *m.* 19. VI. 1910 (No. 2173, 2174 et 2175).

*F. Kurdica* Boiss. et Noe (? , specim. fructifera). Kurdistania Turcica: supra pagum Mâr Jakub prope pagum Simel dit. Môsul, in rupestribus, alt. ca. 1100 *m.* 8. VI. 1910 (No. 2172).

*F. Persica* L. Kurdistania Persica: supra pagum Režâb dit. Ğasr-i-Šîrîn, in quercetis humosis alt. 1500—1800 *m.* 5. V. 1910 (No. 2168 et 2169).

*F. imperialis* L. Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Ğasr-i-Šîrîn, in humosis inter rupes alt. 1700—2000 *m.* 5. V. 1910 (No. 2166).



**Tulipa montana** Lindl. *Persia australis*: Kuh Chormûğ dit. Buşîr (Abu Şehr), supra pagum Hawîze alt. ca. 1600 *m.* 17. II. 1910 (No. 2188); *Persia austro-occidentalis* (Susiana): Siah-Kuh (Puşt-i-Kuh) supra Deilerûn (Deh-i-Loran), 25. III. 1910 (No. 2189); *Kurdistania Persica*: supra pagum Režâb dit. Kâsr-i-Şîrîn, in humosis alt. ca. 1750 *m.* 5. V. 1910 (No. 2187).

*T. Biebersteiniana* R. et Sch. [Flores suaveolentes]. *Kurdistania Persica*: supra pagum Režâb dit. Kâsr-i-Şîrîn, in humosis alt. ca. 1700 *m.* 5. V. 1910 (No. 2190).

**Gagea pusilla** (R. Schm.) Schult. *Kurdistania Persica*: montes supra pagum Režâb dit. Kâsr-i-Şîrîn (Hanikîn), in humosis graminosis alt. ca. 2000 *m.* 5. V. 1910 (No. 2186).

*G. reticulata* (Pall.) Schult. ssp. *eureticulata* Pascher. *Persia austro-occidentalis* (Susiana): inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran), frequens in herbidis ad solum limosum. 24. III. 1910 (No. 2176, 2177 et 2183).

*G. reticulata* ssp. *circinnata* Pasch. (= *G. circinnata* Lond., *G. reticulata* var. *tenuifolia* Boiss.) *Persia australis*: ad vicum Ahrâmi ad pedes montium Kuh Chormûğ dit. Buşîr (Abu Şehr), ad solum argilosum aridissimum. 16. et 17. II. 1910 (No. 2178, 2181 et 2182).

*G. reticulata* ssp. *rigida* Pasch. (= *G. rigida* Boiss. et Sprun., *G. reticulata* var. *fibrosa* Boiss.) *Judaea*: En-nebi Samvîl dit. Hierosolymorum, inter segetes alt. ca. 750 *m.* 3. IV. 1909 (No. 2179).

*G. chlorantha* (M. B.) Schult. *Judaea*: Wâdi es-Sunnâr prope Hierosolyma, alt. ca. 700 *m.* 25. III. 1909 (No. 2180); *Kurdistaniae Turcicae* distr. Hakkîari: mons Dwîle supra pagum Haşîtha dit. Ğulamerik, ad nives alt. ca. 2500 *m.* 18. VI. 1910 (No. 2184).

*G. Persica* Boiss. *Kurdistania Persica*: montes supra pagum Režâb dit. Kâsr-i-Şîrîn (Hanikîn), ad solum argilosum aridum alt. 1400—1800 *m.* 5. V. 1910 (No. 2185).

**Ornithogalum Persicum** (Hausskn. herb. indescr.) Bornm. [Plantae Straussianae IV. p. 102]. *Kurdistaniae Turcicae* distr. Şerîzor: colles inter pagos Dêr Harîr et Baba Ğîğîk dit. Erbil-Rewandûz, in steppa humosa alt. ca. 700 *m.* 20. V. 1910 (No. 2699).

*O. pyramidale* L. (= *O. Narbonense* L. var. *pyramidale* Boiss.) *Judaea*: Bêt Ğemal dit. Hierosolymorum, inter segetes alt. ca. 400 *m.* 7. IV. 1909 (No. 2693); Wâdi Bêt Hanîna prope Hierosolyma, in agris alt. ca. 650 *m.* 25. III. 1909 (No. 2698).

*O. brachystachys* K. Koch [= *O. Narbonense* Boiss. p. p., cf. Handel-Mazzetti: Pteridoph. u. Anthoph. aus Mesopotamien...IV. Annal. d. Naturhist. Hofmus. Wien XXVIII (1914) pag. 18] *Judaea*: Bêt Ğemal dit. Hierosolymorum, inter segetes alt. ca. 400 *m.* 7. IV. 1909 (No. 2692). *Persia austro-occidentalis* (Susiana): ad fluv. Dwerîč inter ruinas Susorum et Deilerûn, in steppa. 24. III. 1910 (No. 2367). Kur-

distania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Ƙasr-i-Širîn (Hanikîn), in herbidis humosis alt. 1100—1500 *m.* 5. V. 1910 (No. 2368 et 2694). Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: Kurruk-Dar prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in humosis alt. ca. 1400 *m.* 22. V. 1910 (No. 2689). Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: montes supra pagum Aradên inter Amadia et Hašitha, inter frutices alt. ca. 1200 *m.*, forma *tepalis albis vitta angustissima pallide viridi ornatis*. 15. VI. 1910 (No. 2691); Kurdistaniae distr. Hakkari: mons Dwîle supra pagum Hašitha dit. Ğlamerik, ad nivem tabescentem alt. ca. 2500 *m.* 18. VI. 1910 (No. 2697); mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter pagos Hašitha et Šattak, in humosis alt. ca. 2600 *m.* 28. VII. 1910 (No. 2690).

*O. comosum* L. Judaea: Wâdi es Sunnâr prope Hierosolyma, in agris alt. ca. 650 *m.* 25. III. 1909 (No. 2700).

*O. cuspidatum* Bert. Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Ƙasr-i-Širîn (Hanikîn), in humosis alt. 1450—1750 *m.* 5. V. 1910 (No. 2363).

*O. tenuifolium* Guss. Armenia Turcica: ad oppidum Malatia legit Fr. Anastase Cadell. (No. 2702).

*O. fimbriatum* Willd. var. *ciliatum* Boiss. Judaea: Jericho, alt. ca. -250 *m.* 19. III. 1909 (No. 2701).

*O. oligophyllum* Bak. var. *stenophyllum* Boiss. [determ. Dr. Handel-Mazzetti]. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar. ad nives tabescentes alt. ca. 2500 *m.* 26. VII. 1910 (No. 2366).

*O. Balansae* Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: mons Maidanoke supra pagum Hašitha dit. Ğlamerik, in alveolis nivalibus alt. ca. 2000 *m.* 20. VI. 1910 (No. 2364); mons Dwîle eiusdem ditionis, ad nives alt. ca. 2500 *m.* 18. VI. 1910 (No. 2291); mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter pagos Hašitha et Šattak, ad nives alt. ca. 2600 *m.* 28. VII. 1910 (No. 2365).

*Urginea maritima* L. Syria: ad pagum Brumâna supra oppidum Beirût, in arenosis aridis alt. ca. 850 *m.* 22. X. 1909 (No. 2362).

*Seilla autumnalis* L. Libanon: ad pagum Brumâna supra oppidum Beirût, in vineis alt. ca. 800 *m.* frequens. 22. X. 1909 (No. 2360).

*S. hyacinthoides* L. Judaea: ad pagum El-Kubebe dit. Hierosolymorum, inter segetes alt. ca. 700 *m.* 3. IV. 1909 (No. 2361).

*S. Persica* Hausskn. [Mitt. Thûr. Bot. Ver. n. F. X (1897) 44]. Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Ƙasr-i-Širîn (Hanikîn), in humosis alt. ca. 1750—1800 *m.* 5. V. 1910 (No. 2298 et 2299).

*Allium vineale* L. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkari: mons Bestabîje prope pagum Hoz inter pagos Hašitha et Šattak, in argillosis aridissimis alt. ca. 1650 *m.* 30. VII. 1910 (No. 2323). Taurus Armenus: mons Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, in graminosis alt. ca. 2300 *m.* 31. VIII. 1910 (No. 2324).

*A. sphaerocephalum* L. Kurdistania Turcica: Ğebel Kumataš (Hamrin) inter Kezrabad et Hanikin, inter segetes alt. ca. 200 *m.* 3. V. 1910 (No. 2349).

*A. sph.* var. *viridi-album* (Tineo) Boiss. Galilaea: Tiberias, in rupestribus alt. ca. -200 *m.* 21. IV. 1909 (No. 2352).

*A. margaritaceum* Sibth. et Sm. Kurdistania Turcica: ad oppidum S'ert, in vineis alt. ca. 900 *m.* 14. VII. 1910 (No. 2328).

*A. marg.* var. *rubellum* Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môsul, inter rupes aridas alt. ca. 1000 *m.* 27. VI. 1910 (No. 2350); colles aridi in valle Sapna ad pagum Mongeš inter Mâr Jakub et Amadia, inter segetes alt. ca. 800 *m.* 23. VI. 1910 (No. 2351).

*A. cilicicum* Boiss. [Pag. 33, fig. 5.] Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: in agris inter oppida Altunköpri et Erbil (Arbela) alt. ca. 250 *m.*, 18. V. 1910 (No. 2321); inter pagos Dêr Harîr et Baba Ğiğik dit. Erbil-Rewandûz, in steppa alt. ca. 700 *m.* 20. V. 1910 (No. 2322).

*A. dyctioprasum* C. A. Mey. [Pag. 33, fig. 5.] *Tepala omnia, exteriora minus profunde, interiora profundius retusa usque subbifida: cuspes antherifera filamentorum interiorum cuspidibus lateralibus ca. duplo brevior*, quae notae etiam specim. originalibus Szowitsianis de Nakitschewan (in herbar. Musei Palat. Vindobon.) adsunt. Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, in pascuis alt. 1900—2400 *m.* 25. VII. 1910 (No. 2358 et 2359).




Fig. 5.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1, 2, 3 *Allium Erdelii* Zucc. var. *lasiophyllum* Nk. 4, *Allium dyctioprasum* C. A. Mey. 5. *Allium cilicicum* Boiss. 1—5 ca.  $2\frac{5}{1}$ .

*A. Hierochuntinum* Boiss. Judaea: ad Jericho, in aridissimis alt. ca. -250 *m.* 19. III. 1909 (No. 2340).

*Allium thrichocephalum* Nábělek spec. nova. [Pag. 34, fig. 6 et Tab. IV, fig. 4\*.] *Schaenoprasa* Boiss. *Bulbi ovati*, ca. 1.5 *cm* *crassi*, *tunicae exteriores cinereae ad basin demum in fibras solutae, interiores albo-membranaceae. Scapus teres vix striatus, rectus, 25—40 cm altus, ad quartam aut tertiam partem foliatus, folia superans. Folia 4, teretia, supra canaliculata, in vaginam striatam ore latiuscule albo-membranaceam*

\* Tabularum appositarum parti V. quae sequetur.



*transeuntes, florendi tempore plerumque emarcida. Umbella globosa, densiflora, 2—2.5 cm diametro tenens, valvis binis late ovatis abrupte subcaudatim attenuatis, pallidis, pedicellis brevioribus, suffulta. Pedicelli filiformes, ca. 12 mm longi, flore 4—5plo longiores. Perigonii albi campanulati phylla obovata, obtusissima, nervo unico percursa, usque ad basin libera, ca. 2.5 mm longa et ca. 2 mm lata. Filamenta filiformia, ima basi solum perigonio adnata, ca. 5 mm longa, perigonio duplo longiora. Antherae flavae. Ovarium globosum profunde trisulcatum, stylo filiformi, ca. 4 mm longo, longe exserto, terminatum.*

In affinitatem *Allii staticiformis* Sibth. et Sm. pertinere videtur, a quo praesertim filamentis perigonio duplo longioribus nec eo sublongioribus et phyllis obovatis nec ovato-oblongis differt.

Crescit in semidesertis Kurdistaniae Persicae ad Kasr-i-Širin dit. Hanikîn, alt. ca. 400 m [7. V. 1910, No. 2336] et Kurdistaniae Turcicae inter pagos Salahije (Kifri) et Tuz Chormati dit. Hanikîn-Kerkuk, alt. ca. 300 m [11. V. 1910, No. 2637].




Fig. 6.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1, 2, 3 *Allium thrichocephalum* Nk. 1, 2 ca.  $\frac{5}{11}$ , 3 ca.  $\frac{10}{11}$ .

*A. anacoleum* Hand.-Mzt. [Pteridoph. u. Anthoph. aus Mesopot. ... Ann. Naturhist. Hofmus. Wien XXVIII. (1914) pag. 17] Kurdistaniae Turcicae distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, in pascuis subhumidis alt. ca. 2400 m. 25. VII. 1910 (No. 2338).

*A. stamineum* Boiss. Gallilaea: 'Ain Tîne et 'Ain Tabra prope Tiberiadem, in rupestribus alt. ca. -150 m. 22. IV. 1909 (No. 2344 et 2347). Kurdistania Turcica (Assyria): Ğebel Kumataş (Hamrîn) inter Kezrabad et Hanikîn, in steppis alt. ca. 200 m. 3. V. 1910 (No. 2343). Ğebel Naft prope Kerkuk, in argilosis aridissimis alt. ca. 300 m. 17. V. 1910 (No. 2348); inter oppida Altunköpri et Erbil (Arbela), inter segetes alt. ca. 250 m. 18. V. 1910 (No. 2345). Kurdistaniae distr. Berwari: ad pagum Aradên in valle Sapna inter pagos Zacho (Azach) et Amadia, inter segetes alt. ca. 900 m. 14. VI. 1910 (No. 2346).

*A. myrianthum* Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum Aradên in valle Sapna inter pagos Zacho (Azach) et Amadia,



inter segetes alt. ca. 900 m. 14. VI. 1910 (No. 2329); ad pagum Mongeš eiusdem ditionis, in steppa alt. ca. 700 m. 23. VI. 1910 (No. 2327).

*A. paniculatum* L. var. *fuscum* Boiss. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: traiectus Serderrian inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in herbidis subhumidis alt. ca. 1200 m. 24. V. 1910 (No. 2320).

*A. callidictyon* C. A. Mey. Kurdistania Turcica (Assyria): Ğebel Hamrîn inter pagos Bakûba et Kezrabad, in aridissimis alt. ca. 200 m. 2. V. 1910 (No. 2353).

*A. Sindjarens* Boiss. et Hausskn. cum praecedente (No. 2354).

*A. Erdelii* Zucc. var. nova **lasiophyllum** n. [Tab. I., fig. 1., pag. 33, fig. 5.] *Elatum, scapis firmis, rectis, usque 40 cm altis. Vaginis et foliis in utraque facie breviter et dense patule hirsutis, indumento ad vaginas longiore. Spathae lobis 3—4 caudato-acuminatis. Pedicellis elongatis, usque 2 cm longis, flore ca. triplo longioribus. Perigonii straminei phyllis manifeste quamquam tenuissime uninerviis. Filamentis perigonio sublongioribus, antheris exsertis, ovario profunde trisulcato.* Palaestina orientalis (Aġlûn): in steppa ad fluv. Jabok inter 'Ammân (Rabbath Ammon) et Ğeraš (Gerasa), alt. ca. 400 m. 17. IV. 1909 (No. 2326).




Fig. 7.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1, 2, 3 *Allium haemanthoides* Boiss. et Reut. 4, 5, 6 *All. Haussknechtii* Nk. 7, 8, 9 *All. Suworowii* Rgl. 1, 5, 7 ca.  $\frac{1}{1}$ , cetera ca.  $\frac{2}{1}$ .

*A. hirsutum* Zucc. Judaea: Wâdi es-Sunnâr prope Hierosolyma, in margine agrorum alt. ca. 700 m. 25. III. 1900 (No. 2357).

*A. eriophyllum* Boiss. Persia australis: ad pagum Hawîze ad radices montium Kuh Chormûġ dit. Bušîr (Abu Šehr), inter segetes. 17. II. 1910 (No. 2341).

*A. laceratum* Boiss. et Noë. Persia austro-occidentalis (Susiana): ad ruinas Susorum, inter segetes. 17. III. 1910 (No. 2333 et 2334).

*A. Carmeli* Boiss. Gallilaea: ad Tell-el-Mutesselim (Megiddo) in planitie Esdrelon dit. Ğennîn, inter segetes 5. V. 1909 (No. 2355); Judaea: inter Hebron et Bethlehem, inter segetes alt. ca. 750 m. 27. V. 1909 (No. 2356).

*A. Neapolitanum* Cyr. Judaea: Wâdi es Sunnâr dit. Hierosolymorum, inter segetes, alt. ca. 650 m, 25. III. 1909 (No. 2331); ad Jericho, in agris alt. ca. -200 m. 19. III. 1909 (No. 2332).

*A. haemanthoides* Boiss. et Reut. [Pag. 35, fig. 7.] Forma floribus carmineis. Kurdistaniae Turicae distr. Serizor: Kurrük-Dar prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in herbidis humosis subhumidis alt. 1600—1900 m. 22. V. 1910 (No. 2316, 2317).

*A. Schuberti* Zucc. Palaestina orientalis (Haurân), ad pagum El-Hösn, inter segetes alt. ca. 650 m. 19. IV. 1909 (No. 2325).

*Allium Fedtschenkoi* Nábělek sp. nova. [Pag. 36, fig. 8, Tab. II., fig. 1.] Sect. II. *Melanoerommyon* \*\* perigonii phylla post anthesin flaccida. *Bulbus magnus, ovato-globosus, ca. 3 cm diametro tenens, tunicis exterioribus nigricantibus, interioribus albis. Scapus ca. 7 cm in solum descendens; eius pars subterranea foliorum vaginis albidis vestita, pars supraterranea omnino nuda, ca. 35 cm alta et ca. 1 cm crassa. Folia ca. 6, omnia basalia, ovato-lineararia, acuta, scapo breviora, ca. 4 cm lata et 18 cm longa, integerrima. Spatha biloba, pedicellis brevior, pallida, scariosa, breviter apiculata. Umbella magna, usque 6 cm diametro tenens, multiflora, hemisphaerica. Pedicelli aequales, ca. 2.5 cm longi, tenui, recti, flore ca. triplo longiores. Perigonii albi phylla tenuissime scariosa, lineari-lanceolata, acuta, nervo apicem non attingenti percursa, basi latiuscule inter se et cum filamentis in cupulam connata, post anthesin flaccida, ca. 7 mm longa et 2 mm lata. Filamenta basi triangulatim dilatata inter se et cum perigonio connata, ceterum subulato-atenuata, omnia aequalia, nervo percursa, perigonio paulo breviora, ca. 6 mm longa. Antherae flavae, ca. 2 mm longae, exsertae. Ovarium obovato-globosum, apice depressum, parum angulatum, leve, stylo demum usque 7 mm longo ex flore longe exserto terminatum.*



Fig. 8.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1, 2 *Allium Fedtschenkoi* Nk. 3, 4, 5 *Allium Rhetoréanum* Nk. 2, 3 ca.  $1\frac{5}{11}$ , 1, 4, 5 ca.  $\frac{3}{1}$ .

In affinitatem *Allii nigri* L. pertinere videtur, a quo tamen praeter ceteras notas floribus multo minoribus, sepalis obtusiusculis ad basin liberis, filamentis brevioribus etc. differt.

Habitat in Kurdistania Persica supra pagum Režâb dit. Kâsr-i-Šîrîn, ubi in herbis humosis alt. ca. 1800 m die 5. V. 1910 specimen unicum legi (No. 2313).

*A. cardiostemon* Fisch. et Mey. [Tab. I., fig. 2., pag. 37, fig. 9.] *Capsula nondum matura globosa, apice retusa, trisulcata, verruculosa; semina minime punctulata.* Kurdistaniae Turcicae distr. Şerizor: Kurruk-Dar prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in humosis humidis ad fontem alt. ca. 1600 m. 22. V. 1910 (No. 2330); distr. Hakkiari: mons Siases prope pagum Haşîtha dit. Gulamerik, in pascuis humosis alt. ca. 1800 m. 19. VI. 1910 (No. 2342).




Fig. 9.

Del. Dr. Fr. Nábělek

*Allium cardiostemon* Fisch. et Mey. 1 Flos ca.  $\frac{3}{4}$ . 2 Stamina et corolla. 3. Filamenta ca.  $\frac{3}{4}$ .

***Allium Haussknechtii*** Nábělek species nova [Pag. 35, fig. 7], [*A. Bischoffii* Hausskn. in sched. nomen nudum] Sect. II. *Melanocrommyon*. *Bulbus magnus, ovato-globosus, tunicis exterioribus brunneis, interioribus albis, vestitus. Scapus crassus, humilis, anthesi incipiente foliis brevior, ca. 18 cm altus et 8 mm crassus, rectus, solum ima basi foliorum vaginis tectus. Folia bina, late oblonga, acuta, usque 12 cm lata, absque vaginis ca. 23 cm longa, in margine angustissime albedo cartilaginea, integra, nitida. Spatha ventricosa, pallide viridis, nitida, biloba, lobis rotundatis, brevissime caudiculatis, anthesi incipiente pedicellis longior et umbellam amplexans, tum pedicellis accrescentibus umbellam liberans. Umbella multiflora, semiglobosa, pedicellis subaequalibus, flores primum ca. 2—3-plo, demum usque 4-plo superantibus, ca. 4 cm longis. Flores magni, albo-viriduli, expansi 18—20 mm diametro tenentes. Perigonii phylla oblongo-lanceolata, acuta, basi inter se et cum filamentis connata, 8—10 mm longa et fere 3 mm lata, post anthesin flaccida. Filamenta omnia basi connata, alternantim basi abrupte dilatata et usque ad basin subulata, ca. 6 mm longa, demum antheris deiectis incurvata. Antherae*



*flavae. Ovarium globoso-depressum, profunde trisulcatum, verruculosum, stylo ca. 3 mm longo terminatum.*

Crescit: inter segetes c. Aleppo prope pagum Moselmia alt. 1200 ped., ubi id legit C. Haussknecht die 14. IV. 1865 [C. Haussknecht, *Iter Syriaco-Armeniacum* 1865, in herbario Mus. Palat. Vindob.]; in Kurdistania Persica: supra pagum Režâb dit. Kasr-i-Širîn, in humosis alt. ca. 1800 m. Legi 5. V. 1910 (No. 2339).

**Allium Rhetoréanum\*** Nábělek sp. nova. [Pag. 36, fig. 8, Tab. III., fig. 1.] Sect. II. *Melanocrommyon* (ovula in locullis biseriata, plerumque tria). *Bulbus ignotus, ca 20 cm in solum descendens. Scapi pars subterranea foliorum vaginis arcte cincta. Folia 4—5, omnia ad soli superficiem scapum floriferum 30—45 cm altum et basi usque 1 cm crassum liberantia, oblongo-lanceolata, acuta, ca. 15—20 cm longa, exteriora usque 5 cm lata, interiora angustiora, pallide viridia, subtus quam supra pallidiora, in margine angustissime albido-cartilaginea, integerrima. Spatha ventricosa, bi- aut triloba, pedicellis brevior, basi albida, versus apicem rosea. Umbella magna, usque 7 cm diametro tenens, multiflora, globosa. Pedicelli aequilongi, usque 3 cm longitudine attingentes, tenues, recti, rosei, flore ca. quintuplo longiores. Perigonii saturate rosei phylla etiam post anthesin erecta, ca. 6—6.5 mm longa et ca. 2 mm lata, scariosa, oblongo-lanceolata, acuta, apice subundulata, basi breviter connata, albida, sursum saturatius colorata. Filamenta basi abrupte dilatata, inter se et cum perigonio connata, supra basin dilatatam subulata, ca. 4 mm longa. Antherae flavae, ca. 2.5 mm longae, perigonii phylla subaequantes. Ovarium globosum, profunde trisulcatum, transverse rugulosum, stylo ca. 3.5 mm longo terminatum.*

Habitu *Allium Caspium* (Pall.) M. B. referens, a quo differt foliis multo latoribus, perigonii phyllis minus alte connatis et imprimis filamentis multo brevioribus.

Crescit in Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari, in monte Dwile supra pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, in pascuis alpinis humosis alt. ca. 2100 m. Legi 18. VI. 1910 (No. 2319).

A. Suvorovii Regel (non Severzowi Rgl.) [Pag. 35, fig. 7; Tab. I., fig. 3.] Schedae Herbarii Florae Asiae Mediae, fasc. VIII., ab universitate Asiae Mediae (Taschkent) Febr. 1926 editi. Specimina cum meis congruentia ad declivia argillosa secundum canalem Salar prope urbem Taschkent 1925. V. 8. legit Vvedensky. [„Cette espèce est plus largement répandue surtout dans la partie méridionale de l'Asie Moyenne sur un sol argileux de préférence dans les rayons cultivés.“] Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: Kurruk-Dař prope pagum Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in humosis alt. ca. 1700 m. 22. V. 1910 (No. 2330).

---

\* Memoriae missionarii doctissimi Dominicani in pago Hašîtha Jacques Rhetoré dedicatum.



**Uropetalum unicolor** Stocks. Persia australis: Kuh Chormûğ dit. Bušîr (Abu Šehr), in steppa, in decliv. argilosis aridis. 19. II. 1910 (No. 2308). Persia austro-occidentalis (Susiana): Siah-Kuh prope Deilerûn (Deh-i-Loran), 22. III. 1910 (No. 2312). Kurdistania Persica: Kâsr-i-Šîrîn dit. Hanikîn, in steppa alt. ca. 400 m. 7. V. 1910 (No. 2311).

**U. Susianum** Nábělek sp. nova. [Pag. 39, fig. 10.] *Bulbus oratus, tunicis exterioribus cinereo-brunneis, interioribus albis. Folia pauca, pallide viridia, anguste linearia, glabra, canaliculata, vaginis suis albis scapi partem subterraneam involucrantes, vagina excepta 20—30 cm longa, scapum aequantia. Scapus usque 35 cm altus, ca. 3 mm crassus, a medio racemum multiflorum (usque 25-florum) secundum, laxum formans. Pedicelli erecti, axi subadpressi, extremitate sua solum curvati, floriferi ca. 5 mm longi, post anthesin elongati et usque 10 mm attingentes, bracteis eis longioribus, demum eos usque subduplo superantibus, e basi auriculato-dilatata extra dorsum albo-scariosa abrupte angustatis, acuminatis, acutissimis suffulti. Flores erecto-patentes, anguste cylindrico-campanulati, perigonii segmentis tribus exterioribus linearibus, obtusis, tubo ad medium fere (ca. 4 mm) adnatis, tum subpatentibus, ca. 16 mm longis, 9-nerviis pallide viridi-flavis, extra nervos pallidioribus, segmentis interioribus quam externa brevioribus, ca. ad 8 mm connatis, conniventibus, parte libera elongato-triangulari, obtusa. Filamenta perigonio ad ca. 4 mm a basi adnata ca. 7 mm longa, antherae ca. 3.5 mm longae. Ovarium brevissime stipitatum, cylindrico-obovatum, ca. 5 mm longum et 3 mm latum, stylum rectum, ca. 6 mm longum, stigmate via trigono terminatum, portans.*

*Uropetalum erythraeo* (Webb.) Boiss. proximum esse videtur, a quo differt statura graciliore et imprimis bractearum forma diversa.

Crescit in Persia austro-occidentali (Susiana), in steppis inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran) ad fluv. Čekâb 24. III. 1910, (No. 2310) et in monticulis Kuh Beijât (Ğebel Hamrîn) inter Deilerûn et oppidum Amara ad Tigridem, 25. III. 1910 (No. 2309).




Fig. 10.

Del. Dr. Fr. Nábělek

*Uropetalum Susianum* Nk. 1. Flos. 2. Perigonium. 3. Ovarium. 4, 5 bractea (ca.  $\frac{2}{1}$ ).

**Muscari longipes** Boiss. Kurdistania Persica: ad Ƙasr-i-Širîn dit. Hanikîn, inter segetes alt. ca. 400 *m.* 7. V. 1910 (No. 2305); ad pagum Režâb dit. Ƙasr-i-Širîn, in herbidis humosis alt. ca. 1500 *m.* 5. V. 1910 (No. 2306).

**M. comosum** Mill. Kurdistania Turcicae distr. Hakkiari: mons Siares supra pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, in humosis subhumidis alt. ca. 1700 *m.* 19. VI. 1910 (No. 2304).

**M. racemosum** (L.) Mill. var. *brachyanthum* Boiss. Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Ƙasr-i-Širîn (Hanikîn), in herbidis alt. ca. 1700 *m.* 5. V. 1910 (No. 2307).

**Bellevalia ciliata** (Cyr.) Nees var. *glauca* Boiss. Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Ƙasr-i-Širîn (Hanikîn), in humosis alt. ca. 1750 *m.* 5. V. 1910 (No. 2314).

**B. ciliata** var. *stenophylla* Boiss. Persia australis: ad oppidum Bušîr (Abu Šehr), in locis desertis limoso-sabulosis Mašîla dictis. 26. I. 1910 (No. 2300).

**B. trifoliata** (Ten.) Kthe. Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, inter segetes alt. ca. 650 *m.* 24. III. 1909 (No. 2303).

**B. macrobotrys** Boiss. Persia austro-occidentalis (Susiana): ad pagum Banauda (Bend-i-Kîr), inter segetes in ripis fluv. Kârûn. 8. III. 1910 (Nr. 2302). In steppis inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran) hic illic frequentissima.

**B. flexuosa** Boiss. Judaea: Wâdi ed-Ğôz dit. Hierosolymorum, in marginibus agrorum alt. 600—700 *m.* 24. III. 1909 (No. 2301).

**Puschkinia scilloides** Ad. Kurdistania Turcicae distr. Šerizor: Handrian-Dar supra pagum Rewandûz dit. Erbil (Arbela), ad nives alt. ca. 2000 *m.* 23. V. 1910 (No. 2297); distr. Hakkiari: mons Dwîle supra pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, ad nives tabescentes alt. ca. 2500 *m.* 18. VI. 1910 (No. 2292 et 2293); mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter pagos Hašîtha et Šattak, ad nives alt. ca. 2600—2700 *m.* 28. VII. 1910 (No. 2296).

**Asphodelus microcarpus** Viv. Judaea: Wâdi Bêt Hanîna prope Hierosolyma, alt. ca. 600 *m.* 26. III. 1909 (No. 2288).

**A. fistulosus** L. Palaestina orientalis (Gilead): in ruinis oppidi Gerasa (Ğeraš), in lapidosis alt. ca. 500 *m.* 18. IV. 1909 (No. 2289).

**A. tenuifolius** Cav. var. *micranthus* Boiss. Arabia Petraea: Ğebel Hârûn (Hor) supra Petram (Wâdi Mûsa), in fissuris rupium arenacearum alt. ca. 1400 *m.* 19. VI. 1909 (No. 2290).

**Asphodeline lutea** (L.) Rehb. Palaestina orientalis: ad pagum Ammân (Rabbath Ammon) in agris alt. ca. 800 *m.* 16. IV. 1909 (No. 2287).

**Eremurus spectabilis** M. B. Kurdistania Persica: montes supra pagum Režâb dit. Ƙasr-i-Širîn (Hanikîn), in humosis alt. ca. 1750 *m.* 5. V. 1910 (No. 2285). Kurdist. Turc. distr. Šerizor: Kurrûk-Dar prope

pagum Rewandûz dit. Erbil (Arbêla), in humosis alt. ca. 1700 *m.* 22. V. 1910 (No. 2286).

### Asparagaceae.

**Asparagus trichophyllus** Bge. Mesopotamia: ad pagum Sawra, inter frutices ad Euphraten. 14. XII. 1909 (No. 2279).

**A. Lownei** Baker. Judaea: El-Rôr prope Jericho, alt. ca. -300 *m.* 15. IV. 1909 (No. 2277).

**A. acutifolius** L. Galilaea: 'Ain Tabra (et-Tabîra) prope Tiberiadem, inter frutices ad fontem alt. ca. -200 *m.* 22. IV. 1909 (No. 2284).

**A. aphyllus** L. Arabia Petraea: Wâdi Bseira inter El-Kerak et Wâdi Mûsa (Petra), ad rupes alt. ca. 450 *m.* 17. VI. 1909 (No. 2283).

**A. stipularis** Forsk. Phoenicia: ad pagum Ekzîb dit. Akka, inter frutices. 30. IV. 1909 (No. 2282).

**A. filifolius** Bertol. Kurdistania Turcica distr. Berwari: ad pagum Haijis in valle Gabenerik inter pagos Hašîtha et Amadia, inter frutices ad fossam irrigationis alt. ca. 800 *m.* 22. VI. 1910 (No. 2278).

**A. verticillatus** L. Persia austro-occidentalis: ad ruinas Susorum, inter frutices Prosopidis stephanianae. 16. III. 1910 (No. 2281). Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môsul, in vineis alt. ca. 900 *m.* 9. VI. 1910 (No. 2280).

**Ruscus aculeatus** L. Galilaea: Tell-el-Kadi dit. Bânias (Caesarea Philippi), inter frutices ad fontem fluv. Jordanis alt. ca. 150 *m.* 25. IV. 1909 (No. 2276). Libanon: ad pagum Brumâna supra Beirût, in rupes-tribus alt. ca. 750 *m.* 15. X. 1909 (No. 2275).

### Smilacaceae.

**Smilax aspera** L. Libanon: ad pagum Brumâna supra oppidum Beirût, in vineis alt. ca. 800 *m.* 18. IX. 1909 (No. 2274).

**S. aspera** var. *Mauritanica* (Desf.) Bois. Galilaea: ad Tell el-Kadi dit. Bânias (Caesarea Philippi), inter frutices ad fontem fluv. Jordanis alt. ca. 150 *m.* 25. IV. 1909 (No. 2273).

### Dioscoreaceae.

**Tamus communis** L. var. *Cretica* (L.) Boiss. Judaea: ad pagum Abu Rôš dit. Hierosolymorum, ad rupes calc. alt. ca. 400 *m.* 2. IV. 1909 (No. 2272).

### Juncaceae.

**Juncus glaucus** Ehrh. Kurdistania Turcica (Assyria): in oryzetis ad pagum Maltai dit. Môsul, alt. ca. 450 *m.* 6. VI. 1910 (No. 897). Forma *pallidipes* m.: *cataphyllis ad basin tantum pallide brunneis, ceterum pallidis, tepalis pallide flavo-viridibus, capsula stramineo-flava acutiuscula, mucronulata, tepalis aequilonga.* Arabia Petraea: ad fontem Ğerba inter Ma'ân et Šôbak, 21. VI. 1909 (No. 910). Forma *pullipes* m.: *cata-*



*phyllis basi nigro-castaneis, lucidis, tepalis stramineis, capsula acutiuscula, superne attenuata, mucronulata, flavo-brunnea, tepalis sublongiore.*

**Juncus Warakensis** Nábělek sp. nova. [Tab. IV., fig. 1.; pag. 42, fig. 11.] Junci genuini Buchenau. *Rhizoma horizontale, repens, sublignosum, squamis castaneo-purpureis, nitidis, vestitum. Caules erecti, tenaces, arcte sulcati, parum glauci, 50—75 cm alti, 1.5—2 mm crassi, basi cataphyllis vaginantibus, caulibus non adpressissimis, apice obtusissimis, non mucronatis, infimis purpureo-castaneis, nitidis, superioribus ad basin tantum coloratis, superne pallidis, summis usque 11 cm longis. suffulti. Medulla asterisciformis, continua. Inflorescentia anthelata, decomposita, contracta, conglobata, densa. Bractea infima longa, recta, 15—20 cm attingens, in vaginam brevem et angustam sensim dilatata. Bractee superiores breves, 5—8 mm longae, obovatae, obtusae, mucronatae. Flores castaneo-brunnei, tepala rigida, exteriora ca. 3 mm longa, anguste lanceolata, longe acuminata, acutissima, dorso subcarinata, flava, in margine angustissime hyalina, ceterum castanea; tepala interiora breviora, ca. 2.25 mm longa, sublatis, minus longe acuminata, ac exteriores similiter colorata. Stamina 6, ca. 2 mm longa; antherae lineares, filamentis sublongiores. Fructus ovatus trigonus, basi breviter angustatus, apice subtruncatus, mucronulatus, atro-castaneus, nitidus, ca. 3.25 mm longus et 1.5 mm latus. Semina nondum maturissima ca. 0.5—0.75 mm longa, oblique obovata, apiculata, brunnea, regulariter reticulata, hyaline marginata, margine basi et apice apiculatim producta.*




Fig. 11.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

*Juncus Warakensis* Nk. 1—4 ca.  $\frac{3}{11}$ , 5 (semen) ca.  $\frac{50}{1}$ .

Ex affinitate proxima Junci glauci Ehrh. esse videtur, a quo differt cataphyllis basi nitidissimis, purpureo-castaneis, non mucronatis, medulla continua nec interrupta, anthelis confertioribus, tepalis interioribus brevioribus, capsulis sublongioribus, apice subtruncatis, seminibus obtusius apiculatis.

Crescit in Tauro Armeno in monte Warak-Dar prope Wan, in humidis ad monasterium Werin-Warak alt. ca. 2000 m. Legi 23. VIII. 1910 (No. 907).

*J. acutus* L. Galilaea: 'Ain Tine prope Tiberiadem, ad fontes



alt. ca. -200 *m.* 22. IV. 1909 (No. 955). Persia austro-occidentalis (Susiana): in paludibus ad ruinas Susorum frequens. 15. III. 1910 (No. 874).

*J. maritimus* Lam. var. *arabicus* Asechers. Judaea: El-Rôr ad Jericho, alt. ca. -300 *m.* 10. VI. 1909 (No. 912). Moab: Hammâmez-Zerka (Kallirrhöe) dit. Mâdaba, ad rivum alt. ca. -250 *m.* 28. VI. 1909 (No. 925). Arabia Petraea: in peninsula Maris Mortui El-Lisân, ad Mezra'a alt. ca. -350 *m.* 15. VI. 1909 (No. 920); ad fontem Ğerba dit. Ma'an.

*J. punctorius* L. var. *Schimperi* (Hochst.) Buchenau. Arabia Petraea: Wâdi Busejra inter El-Kerak et Wâdi Mûsa (Petra), ad fontem 'Ain es-Sa'we alt. ca. 400 *m.* 17. VI. 1909 (No. 913); ad fontem Ğerba inter Ma'an et Šôbak. 21. VI. 1909 (No. 911).

*J. punctorius* L. var. *exaltatus* (Decne) Buchenau. Arabia Petraea: ad fontem Ğerba cum praecedenti. 21. VI. 1909 (No. 915).

*J. lamprocarpus* Ehrh. Libanon, ad pagum Brumâna dit. Beirût, ad fontem alt. ca. 800 *m.* X. 1909 (No. 909). Armenia Turcica: Warak-Dar prope Wan, ad monasterium Werin-Warak alt. ca. 2000 *m.* 23. VIII. 1910 (No. 890).

*J. Fontanesii* Gay. Galilaea: planities Esdrelon, in paludibus ad Tell-el-Mutesselim (Megiddo) dit. Ğenîn, 6. V. 1910 (No. 950). Arabia Petraea: ad fontem Ğerba inter Ma'an et Šôbak. 21. VI. 1909 (No. 911).

*J. Fontanesii* Gay. var. *pyramidatus* (Lah.) Buchenau. Kurdistania Turcica (Assyria): inter pagos Tell Kef et Maltai dit. Mûşul, ad fossas irrigationis alt. ca. 400 *m.* 6. VI. 1910 (No. 884).

*J. bufonius* L. Kurdistaniae Turcae distr. Şerizor: ad pagum Dêr Harîr inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in humidis alt. ca. 650 *m.* 20. V. 1910 (No. 883).

*J. bufonius* L. var. nova **Susianus** Nábělek: Tab. IV. fig. 2\*. *Caules usque 30 cm alti, folia caulina inferiora graminiformia, cum vagina usque 20 cm longa. Tepala exteriora usque 8 mm attingentia, interiora ca. 6 mm longa, obtusiuscula, brevissime mucronulata. Capsula ca. 5 mm longa, pallida, nitida.* Persia austro-occidentalis (Susiana): in paludibus ad ruinas Susorum. 16. III. 1910 (No. 876).

### Cyperaceae.

**Pycreus** *flavescens* (L.) Rehb. [= *Cyperus flavescens* L. = *Chlorocyperus flavescens* (L.) Rikli]. Syria: Libanon, ad monasterium Mâr Šâja prope pagum Brumâna dit. Beirût, in humidis alt. ca. 800 *m.* X. 1909 (No. 908).

**Galilea** *mucronata* (L.) Parl. [= *Cyperus Aegyptiacus* Glozin = *C. schoenoides* Griseb. = *Schoenus mucronatus* L.] Syria: in sabulosis maritimis ad oppidum Haifa. 1. V. 1909 (No. 946).

---

\* Tabularum appositarum parti V. quae sequetur.

**Cyperus fuscus** L. [= *Eucyperus fuscus* (L.) Rikli]. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: in oryzetis ad fluv. Zab. dit. Kočânes, alt. ca. 1200 m. 5. IX. 1910 (No. 906). Forma *humilis, culmis* (2·5)—4—7 cm *altis, glumis virescentibus aut pallide fuscis*.

*C. fuscus* L. forma **atriceps** m. [= *Eucyperus fuscus* (L.) Rikli f. *atriceps*] *glumis praeter carinam viridem atrofuscis, fere nigris*. Taurus Armenus: ad pagum Sakrât inter oppida Muš et Charput, in ripa limosa rivi alt. ca. 1000 m. Forma *robusta culmis usque 20 cm altis, anthesis compositis*. 1. X. 1910 (No. 960); in glarea rivi Gök-Su prope pagum Surgi inter Muš et Charput, alt. ca. 900 m. Forma *nana, culmis* 2—4 cm *altis, anthesis capituliformibus*. 10. X. 1910 (No. 892).

*C. distachyus* All. [= *Acorellus distachyus* (All.) Palla = *Chlorocyperus junciformis* Rikli]. Persia austro-occidentalis (Susiana): in paludibus ad ruinas Susorum. 15. III. 1910 (No. 877 et 957).

*C. alopecuroides* Rottb. [= *Acorellus alopecuroides* m.] Moab: Hammâm ez-Zerka (Kallirrhoë) ad litus orientale Maris Mortui dit. Mâdaba, ad rivum alt. ca. -200 m. 27. VI. 1909 (No. 919 et 930). Rôr el-Mezra'a in peninsula Maris Mortui El-Lisân, ad litus alt. ca. -390 m. Forma *spicis omnibus* (5—12) *in capitulum congestis nec umbellam compositam formantibus*. 14. VI. 1909 (No. 952).

**Chlorocyperus globosus** (All.) Palla [= *Cyperus globosus* All.] Kurdistania Turcica (Assyria): inter pagos Tell Kef et Maltai dit. Môşul, ad rivum alt. ca. 400 m. 6. VI. 1910 (No. 903); distr. Ramorân: inter pagos Hadide et Godianos ad orientem ab oppido S'ert, in saliceto ad rivum alt. ca. 600 m. 17. VII. 1910 (No. 887). Taurus Armenus: in glarea rivi Gök-Su ad pagum Surgi inter Charput et Mar'aş, alt. ca. 900 m. Forma *pumila culmis* 2—4 cm *altis, spiculis ca. 1 cm longis et 3 mm latis, in capitulum dispositis*. 10. X. 1910 (No. 893).

*Ch. longus* (L.) Palla [= *Cyperus longus* L.] Palaestina orientalis: 'Ain eš-Šuneî in Wâdi Ġeria dit. 'Ammân (Rabbath Ammon), alt. ca. 750 m. 15. IV. 1909 (No. 927). Galilaea: 'Ain Tabra prope Tiberiadem, ad fontem alt. ca. -200 m. 22. IV. 1909 (No. 937). Arabia Petraea: Seil ed-Drâ dit. El-Kerak, ad rivulum alt. ca. 0 m. 15. VI. 1909 (No. 954); Wâdi Heidân dit. El-Kerak, ad rivulum alt. ca. 350 m. 25. VI. 1909 (No. 953).

*Ch. longus* (L.) Palla var. *pallidus* Boiss. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, ad rivum alt. ca. -250 m. 30. III. 1909 (No. 928). Persia austro-occidentalis (Susiana): in paludibus ad ruinas Susorum. 14. III. 1910 (No. 880). Kurdistania Turcica (Assyria): ad rivum inter pagos Tell Kef et Maltai dit. Môşul, alt. ca. 400 m. 6. VI. 1910 (No. 881).

*Ch. longus* (L.) Palla var. *Heldreichianus* Boiss. Galilaea: 'Ain Tine prope Tiberiadem, ad fontem alt. ca. -200 m. 22. IV. 1909 (No. 935).

*Ch. rotundus* (L.) Palla [= *Cyperus rotundus* L.] Galilaea: 'Ain Tine prope Tiberiadem, ad fontem alt. ca. -200 *m.* 22. IV. 1909 (No. 936). Judaea: 'Ain Fâra in Wâdi Fâra dit. Hierosolymorum, ad rivulum alt. ca. 400 *m.* Spiculis usque 25 *mm* longis ad var. *macrostachyus* Boiss. vergens, forma glumis pallidis. 18. V. 1909 (No. 939). Mesopotamia: in silvulis *Salicum* et *Populi Euphratici* in ripa Tigridis prope Môsul, alt. ca. 250 *m.* Forma glumis intense coloratis praedita, spiculis aut 10—15 *mm* (No. 872) aut usque 25 *mm* (var. *macrostachya* Boiss., No. 914) longis. 30. V. 1910.

*Schoenoplectus supinus* (L.) Palla [= *Scirpus supinus* L.] Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: in oryzetis in valle fluv. Zab dit. Kočânes, alt. ca. 1200 *m.* 5. IX. 1910 (No. 904).

*S. Tabernaemontani* [Gmel.] Palla [*Scirpus Tabernaemontani* Gmel.] Persia austro-occidentalis (Susiana): in paludibus ad ruinas Susorum. 14. III. 1910 (No. 2294). Armenia Turcica: Wan, in paludibus ad ripas lacus. 9. IX. 1910 (No. 959).

*S. litoralis* (Schräd.) Palla [= *Scirpus lit.* Schräd.] Galilaea: 'Ain Tine prope Tiberiadem, ad fontem alt. ca. -200 *m.* 22. IV. 1909 (No. 955). Persia austro-occidentalis (Susiana): in paludibus ad ruinas Susorum. 14. III. 1910 (No. 879 et 3403). Kurdistania Turcica (Assyria): ad pagum Tell Kef (Tell-is-Kof) dit. Môsul, in ripa rivi alt. ca. 350 *m.* 6. VI. 1910 (No. 886).

*Holoschoenus vulgaris* (L.) Link [= *Scirpus Holoschoenus* L.] var. *vulgaris* Koch. Arabia Petraea: El-Mezra'a in peninsula Maris Mortui El-Lisân, ad litus alt. ca. -390 *m.* 15. VI. 1909 (No. 918).

*H. vulgaris* var. *australis* (L.) Rehb. Moab: Hammâm ez-Zerka (Kallirrhöë), ad litus orient. Maris Mortui dit. Mâdaba, ad rivum alt. ca. -200 *m.* 28. VI. 1909 (No. 917). Palaestina orientalis: Ğeraš (Gerasa), ad rivum alt. ca. 500 *m.* Kurdistania Turcica (Assyria): inter pagos Tell Kef et Maltai dit. Môsul, ad rivum alt. ca. 400 *m.* 6. VI. 1910 (No. 885 et 902). Kurdistaniae distr. Hakkiari: Ğelo-Dar dit. Ğulamerik, ad tentoria aestiva Djezra, alt. ca. 2500 *m.* 4. IX. 1910 [Forma capitulis 1—2, altera sessili, altera breviter pedunculata, diam. 0.5—1 *cm* tenentibus. Culmi 30—35 *cm* alti. No. 905]. Kurdistania Persica: ad pagum Režâb dit. Kaşr-i-Şirin, in humidis alt. ca. 800 *m.* 6. V. 1910 (No. 895). Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum Aradên dit. Amadia, in oryzetis alt. ca. 850 *m.* 14. VI. 1910 (No. 898). No. 895 et 898: forma capitulis plerumque singulis, 4—5 *mm* diam. tenentibus. Culmi 15—25 *cm* alti.

*Blysmus compressus* (L.) Panz. Kurdistaniae Turcicae distr. Hakkiari: traiectus Chômar inter pagos Hašîtha et Šattak, in pascuis alt. ca. 2300 *m.* 30. VII. 1910 (No. 889).

*Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla (= *Scirpus maritimus* L.) Judaea: ad pagum Bêt Ğemâl dit. Hierosolymorum, alt. ca.



450 m. 7. IV. 1909 (No. 943). Galilaea: 'Ain Tîne et 'Ain Tabra (et-Tabira) prope Tiberiadem, ad fontes alt. ca. -200 m. 22. IV. 1909 (No. 933, 938, 941); planities Esdrelon, in paludibus ad Tell-el-Mutesselim (Megiddo) dit. Ġenîn, 6. V. 1909 (No. 929 et 949). Mesopotamia: ad Museijib inter Bardâd et Kerbela, ad limum in ripis Euphratis. 14. IV. 1910 (No. 958); Babylon, ad limum Euphratis, 17. IV. 1910 (No. 871). Persia austro-occidentalis (Susiana): in paludibus ad ruinas Susorum. 16. III. 1910 (No. 873).

*Fimbristylis ferruginea* (L.) Vahl. Moab: Hammân ez-Zerķa (Kallirrhoe) ad litus orientale Maris Mortui dit. Mâdaba, ad rivum alt. ca. -200 m. 28. VI. 1909 (No. 916) Arabia Petraea: Rôr el-Mezra'a in peninsula Maris Mortui El-Lisân, ad litus alt. ca. -390 m. 14. VI. 1909 (No. 932); Seil ed-Drâ dit. El-Kerak, ad rivulum alt. ca. 0 m. 15. VI. 1909 (No. 922).

*F. dichotoma* (L.) Vahl. Arabia Petraea: Seil ed-Drâ dit. El-Kerak, ad rivulum alt. ca. 0 m. 15. VI. 1909 (No. 923); Wâdi Heidân inter El-Kerak et Wâdi Mûsa (Petra), ad rivum alt. ca. 300 m. 25. VI. 1909 (No. 940).

*Schoenus nigricans* L. Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: vallis Sapna inter pagos Zacho (Azach) et Amadia, ad pontem supra rivum Sapnika, in declivit. subhumidis alt. ca. 680 m. 15. VI. 1910 (No. 900).

*Carex stenophylla* Wahlbg. var. *planifolia* Boiss. *forma glumis et bracteis atro-fuscis*. Palaestina orientalis (Haurân): Tell-el-Hösn, in steppa humosa alt. ca. 600 m. 19. IV. 1909 (No. 956). Persia austro-occidentalis (Susiana): in steppis ad fluv. Dwerîč (Duweirîč) inter ruinas Susorum et Deilerân (Deh-i-Loran), 24. III. 1910 (No. 882). Kurdistania Persica: ad pagum Režâb dit. Ķasr-i-Šîrîn, in humosis alt. ca. 1200 m. 5. V. 1910 (No. 896).

*C. divisa* Huds. Judaea: ad pagum Bêt Ġemâl dit. Hierosolymorum, ad rivulum alt. ca. 400 m. 7. IV. 1909 (No. 951). Galilaea: planities Esdrelon, in paludibus ad Tell-el-Mutesselim (Megiddo) dit. Ġenîn. 5. V. 1909 (No. 944). Persia austro-occidentalis (Susiana): in paludibus ad ruinas Susorum. 15. III. 1910 (No. 878). Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: ad pagum Aradên dit. Amadia, ad rivum alt. ca. 800 m. 14. VI. 1910 (No. 901).

*C. vulpina* L. Galilaea: 'Ain Tabra (et Tabira) prope Tiberiadem, ad fontem alt. ca. -200 m. 22. IV. 1909 (No. 948).

*C. Goodenoughii* Gay. Kurdistaniae Turcicae distr. Šerizor: traiectus Serderrian inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, ad rivulum alt. ca. 1000 m. 24. V. 1910 (No. 894). Taurus Armenus: Warak-Dar dit. Wan, ad monasterium Werin-Warak, ad rivum alt. ca. 2200 m. 23. VIII. 1910 (No. 891).



*C. distans* L. forma **atripes** m. *spiculis longiuscule pedunculatis, infimis pendulis. Cataphyllis atro-castaneis.* Palaestina borealis: Tell-el-Kadi dit. Bânias (Caesarea Philippi), ad fontem Jordanis alt. ca. 150 m. 25. IV. 1909 (No. 942).

Forma **longebracteata** m. [Tab. II., fig. 2\*.] *spiculis omnibus erectis, bracteis longissimis (inferioribus usque 15 cm longis et 4 mm latis) suffultis.* Galilaea: in planitie Esdrelon dit. Haifa, in palude. 1. V. 1909 (No. 945).

Forma *cataphyllis pallidis*: Kurdistaniae Turcicae distr. Berwari: in valle Sapna inter pagos Zacho (Azach) et Amadia, ad pontem supra rivum Sapnika, alt. ca. 680 m. 15. VI. 1910 (No. 899).

### Corrigenda.

*Conyza Varthemiodides* Nk. sp. n. (harum publicationum No. 52, pag. 7) monente cl. J. Bornmüller (in litteris) = *Phagnolon Kotschyi* Schultz Bip., forma caulibus albo-tomentosis.

*Cynara Kurdica* Hand.-Mzt. (Handel-Mazzetti, Pteridophyta u. Anthoph. aus Mesopotamien... p. 445, harum public. No. 52, pag. 34) = *Cynara aurantiaca* Post (Bull. Herb. Boiss. 1893, pag. 400; cl. Jos. Bornmüller in litteris).

*Centaurea schizophylla* Nk. sp. n. (harum publ. No. 52, pag. 42) *Centaureae myriocephalae* Schultz bip. adnumeranda est, cuius varietas [*C. m. Sch. bip. var. schizophylla* Nk.] esse videtur. Cf. Bornmüller: Neue orient. Arten u. Varietäten d. Gattung *Centaurea*. Fedde Repet. XXIV (1928) pag. 371.

---

\* Tabularum appositarum parti V. quae sequetur.

## Index generum.

- Acantholimon 3  
 Aceras 26  
 Achyranthes 12  
 Acorellus 44  
 Aerva 12  
 Alisma 25  
 Allium 32  
 Amarantus 11  
*Amaryllidaceae* 29  
 Anabasis 11  
 Anacamptis 26  
 Andrachne 20  
*Araceae* 25  
 Arceuthobium 15  
 Arisarum 25  
 Aristolochia 16  
 Arthrocnemum 10  
 Arum 25  
 Asparagus 41  
 Asphodeline 40  
 Asphodelus 40  
 Atraphaxis 13  
 Atriplex 9  
 Bassia 9  
 Bellevalia 40  
 Beta 8  
 Biarum 25  
 Blitum 8  
 Blysmus 45  
 Boerhaavia 14  
 Bolboschoenus 45  
 Carex 46  
 Celtis 21  
 Cephalanthera 27  
 Ceratocarpus 9  
*Chenopodiaceae* 8  
 Chenopodium 8  
 Chlorocyperus 43, 44  
 Colchicum 29  
 Cornulaca 11  
 Crocus 28  
 Crozophora 20  
*Cupuliferae* 21  
*Cyperaceae* 43  
 Cyperus 43, 44  
*Cytinaceae* 16  
 Daphne 14  
*Dioscoreaceae* 41  
 Elaeagnus 15  
 Emex 12  
 Epipactis 27  
 Eremurus 40  
 Eucyperus 44  
 Euphorbia 16  
 Eurotia 9  
 Ficus 21  
 Fimbristylis 46  
 Forskahllea 20  
 Fritillaria 30  
 Gagea 31  
 Galilea 43  
 Gladiolus 28  
 Halocharis 11  
 Halocnemum 10  
 Haloxylon 10  
 Helicophyllum 25  
 Himantoglossum 26  
 Hippophaë 15  
 Holoschoenus 45  
*Hydrocharitaceae* 25  
 Iris 28  
 Ixiolirion 29  
 Juglans 21  
 Juncus 41  
 Kochia 9  
 Laurus 15  
*Liliaceae* 30  
 Limodorum 28  
 Loranthus 16  
 Loriglossum 26  
 Mercurialis 20  
 Merendera 30  
*Monocotyledoneae* 25  
 Muscari 40  
 Narcissus 29  
 Noëa 11  
*Nyctaginaceae* 14  
*Orchideae* 26  
 Orchis 26  
 Ornithogalum 31  
 Osyris 15  
 Oxyria 12  
 Parietaria 20  
 Petrosimonia 11  
 Pilostyles 16  
 Plantago 4  
 Platanus 21  
*Plumbagineae* 3  
 Poinsettia 20  
*Polygoneae* 12  
 Polygonum 13  
 Populus 24  
 Potamogeton 25  
 Pterocarya 21  
 Pteropyrum 12  
 Puschkinia 40  
 Pycreus 43  
 Quercus 21  
 Rheum 12  
 Ricinus 20  
 Rumex 12  
 Ruscus 41  
 Salix 24  
*Salsolaceae* 8  
 Salsola 10  
*Santalaceae* 15  
 Schoenoplectus 45  
 Schoenus 43, 46  
 Scilla 32  
 Scirpus 45  
 Smilax 41  
 Spiranthes 28  
 Sternbergia 29  
 Suaeda 10  
 Tamus 41  
 Thesium 15  
*Thymelaeaceae* 14  
 Thymelaea 15  
 Tulipa 31  
 Typha 26  
 Urginea 32  
 Uropetalum 39  
 Urtica 20  
 Vallisneria 25  
 Viscum 15  
 Zannichellia 25  
 Zekoua 21



Phot. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Allium Erdelii* Zucc. var. *lasiophyllum* Nk. 2. *Allium cardiostemon* Fisch. et Mey.  
3. *Allium Suworowii* Rgl.







Phot. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Allium Fedtschenkoii* Nk. 2. *Andropogon hirtus* L. var. *glaucus* Nk.





Phot. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Allium Rhetoréanum* Nk. 2. *Polypodium vulgare* L. var. *glaucum* Nk.







Phot. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Juncus Warakensis* Nk. 2. *Agropyrum cristatum* (Schreb.) P. Beauv. var. *incanum* Nk.  
 3. *Koeleria phleoides* (Vill.) Pers. var. *thrichantha* Nk. 4. *Plantago thrichophylla* Nk.  
 5. *Gentiana aurea* L. f. *nana*.



66. FR. VITÁSEK: Morfologický vývoj Hlučínska. (The morphological development of Hlučín.) (38 p.) Kč 7.—.
67. FR. ŘÍKOVSKÝ: Terasy dolní Svitavy a dolní Svratky. (Les terrasses de la Svitava inférieure et de la Svratka inférieure.) (17 p.) Kč 5.—.
68. V. ČUPR: O absorpci chlorovodíku a kysličníku siřičitého v kyselině sírové a v kyselině octové. [Pokračování.] (On the absorption of hydrogen chloride and sulphur dioxide in sulphuric acid and acetic acid.) [Continuation.] (18 p.) Kč 3·50.
69. J. KLAČKA: O W-kongruencích s fokálními plochami přímkovými. (Sur les congruences *W* dont les surfaces focales sont réglées.) (31 p.) Kč 6·50.
70. F. NÁBĚLEK: Iter Turcico-Persicum. Pars III: Plantarum collectarum enumeratio. (75 p.) Kč 16·50.
71. V. ROSICKÝ: O krystalech pyropu od Agua Suja v Brasílii. (Sur les cristaux du pyrope de Agua Suja en Brésil.) (9 p.) Kč 2.—.
72. O. BORŮVKA: Sur les correspondances analytiques entre deux plans projectifs. Première partie. (40 p.) Kč 8.—.
73. J. FŘEJKA a L. ZAHLOVÁ: Katalytická redukce dimethylglyoximu 2,3-diaminobutan. (Réduction catalytique du diméthylglyoxime 2,3-diaminobutane.) (43 p.) Kč 7.—.
74. F. HERČÍK: Jak působí světlo na povrchové napětí rostlinných štav. (The Influence of Light on the Surface Tension of Plant Sap.) (18 p.) Kč 3.—.
75. B. VALOUŠEK: Kopulace žabronožky sněžní, *Chirocephalus Grubii* Dyb. (Copulation chez *Chirocephalus Grubii* Dyb.) (15 p.) Kč 3.—.
76. G. ŠIRJAEV: Onobrychis generis revisio critica. Partes secunda et tertia. (165 p.) Kč 26·50.
77. B. KONEČNÝ a V. ROSICKÝ: O některých skapolithech moravských. (Sur quelques scapolites de Moravie.) (28 p.) Kč 5·50.
78. FR. ŘÍKOVSKÝ: Vztah mezi atm. srážkami a nadm. výškou na Moravě a ve Slezsku. (Le rapport entre les précipitations atmosphériques en Moravie et en Silésie et l'altitude au dessus du niveau de la mer.) (15 p.) Kč 3·50.
79. J. AUGUSTA: »*Asterophyllites Dumasi* Zeill. var. *moravicus* nov. var.« z permu boskovické brázdy. (»*Asterophyllites Dumasi* Zeill. var. *moravicus* nov. var.« du Permien de la fosse de Boskovice.) (12 p.) Kč 2·50.
80. J. KAUCKÝ: O přechodu diferenční rovnice hypergeometrické v diferenční rovnici rovnici Gaussovu. (Sur le passage de l'équation hypergéométrique aux différences finies à l'équation différentielle de Gauss.) (43 p.) Kč 8.—.
81. FR. KOLÁČEK: Était l'Ousboï pendant les temps historiques un ancien lit de l'Amou-Daria? (8 p.) Kč 2.—.
82. J. WOLDŘICH a J. AUGUSTA: Náčrtek geologických poměrů v okolí Luhačovic se zřetelem na vznik jejich minerálních pramenů. (Sur la situation géologique des environs de Luhačovice et l'origine de leurs sources minérales.) (17 p.) Kč 3·50.
83. J. V. DUBSKÝ a ARN. OKÁČ: Příspěvek k analytickému studiu kyseliny dusité. (Contribution à l'étude analytique de l'acide azoteux.) (84 p.) Kč 12·50.
84. V. SUK: On the Occurrence of Syphilis and Tuberculosis amongst Eskimos and Mixed Breeds of the North Coast of Labrador. (18 p.) Kč 4.—.



85. O. BORŮVKA: Sur les correspondantes analytiques entre deux plans projectifs. (Deuxième partie.) (34 p.) Kč 6 50.
86. ZD. HORÁK: Zobečnění pojmu variety. (Sur une généralisation de la notion de variété.) (20 p.) Kč 3 50.
87. V. ŠAUER: Čopský ohyb Tisy. (Le détour de la Theiss près de Čop.) (18 p.) Kč 3.—.
88. O. KRIEBEL: Příspěvek ke studiu tukového tělesa Chironomid. I. (Contribution à l'étude du corps adipeux des Chironomides. I.) (15 p.) Kč 3 50.
89. J. ZAHRADNÍČEK: Měření modulu pružnosti v tahu metodou dynamickou. (Determination of the Elasticity Modulus of a Rod as Cantilever or with Loads by dynamical Methods.) (12 p.) Kč 2 50.
90. J. BAŤA: Některé pokusy o geometrických pravděpodobnostech. (Quelques expériences sur les probabilités géométriques.) (22 p.) Kč 4 50.
91. E. ČECH: Propriétés projectives du contact. I. (36 p.) Kč 6 50.
92. J. SAHÁNEK: Výklad vzniku krátkých elektromagnetických vln v elektronových lampách. II. část. (An Explanation of the Origin of short electromagnetic Waves in Valves. Part II.) (24 p.) Kč 4.—.
93. B. HOSTINSKÝ: Sur les transformations itérées des variables aléatoires. (24 p.) Kč 4.—.
94. FR. ŘÍKOVSKÝ: Klimatická proměnlivost atmosférických srážek a její vztah k Brücknerově theorii. (Les variations climatiques des précipitations atmosphériques et leurs rapports à la théorie de Brückner.) (60 p.) Kč 11.—.
95. J. ZAHRADNÍČEK: Měření termomagnetického longitudinálního efektu potenciálového. (De l'effet thermomagnétique longitudinal.) (19 p.) Kč 4.—.
96. J. AUGUSTA: „Lonchopteris Jongmansii nov. sp.“ z kamenouhelné pánve rosického-oslavanské. („Lonchopteris Jongmansii nov. sp.“ des bassins houiller de Rosice-Oslavany en Moravie [Tchécoslovaquie].) (11 p.) Kč 3.—.
97. JAN STEJSKAL: Pásmo porfyroidové ve Vrbenském devonu na východním okraji Vysokého Jeseníku. (La zone de porphyroïdes dévoniens de Vrbno aux abords Est de Vysoký Jeseník en Silésie.) (34 p.) Kč 6 50.
98. FR. SCHACHERL: La réfraction de l'hélium et de l'argon et sa dépendance des pressions inférieures à une atmosphère. (15 p.) Kč 3 50.
99. FR. SCHACHERL: La réfraction de l'oxyde de carbone, de l'azote et de azoteux et sa dépendance des pressions intérieures à une atmosphère. (29 p.) Kč 7.—.
100. M. KONEČNÝ: Contribution à l'étude des propriétés projectives du contact. (19 p.) Kč 4.—.
101. J. PODPĚRA: Quod momentum significet Carex pediformis in stepposis silvaticis Europae mediae. (22 p.)
102. G. ŠIRJAEV: Generis Trigonella L. revisio critica I. (58 p.)
103. J. V. DUBSKÝ a FR. BRYCHTA: Příspěvek ke studiu komplexních solí dimethylglyoximu. (Contribution à l'étude combinaisons complexes de la dimethylglyoxime.) (28 p.)
104. J. KAUCKÝ: Sur une classe de surfaces. (22 p.)
105. FR. NÁBĚLEK: Iter Turcico-Persicum. Pars IV: Plantarum collectarum enumeratio. (Plumbagineae-Cyperaceae.) (22 p.)

Seznam sešitů 1—100 zašle na požádání Přírodovědecká fakulta  
(Brno, Kounicova 63).

Pour le catalogue des fascicules 1—100 s'adresser à la Faculté des Sciences  
(Brno, Kounicova 63).